



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 532 456 B1**

12

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

Veröffentlichungstag der Patentschrift: 29.03.95

Int. Cl.⁶: **C07D 211/26**, A61K 31/445,
C07D 401/06

Anmeldenummer: 92810594.9

Anmeldetag: 04.08.92

1-Acylpiperidinverbindungen und ihre Verwendung als Substanz P Antagonisten.

Priorität: 12.08.91 CH 2374/91

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
17.03.93 Patentblatt 93/11

Bekanntmachung des Hinweises auf die
Patenterteilung:
29.03.95 Patentblatt 95/13

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL
PT SE

Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 428 434


Patentinhaber: CIBA-GEIGY AG
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel (CH)

Erfinder: Schilling, Walter, Dr.
Im Muspenacker
CH-4204 Himmelried (CH)
Erfinder: Ofner, Silvio, Dr.
Hauptstrasse 1
CH-4142 Münchenstein (CH)
Erfinder: Veenstra, Siem J., Dr.
Laufenstrasse 29
CH-4053 Basel (CH)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung betrifft neue 1-Acylpiperidinverbindungen der Formel I



worin R₁ unsubstituiertes oder im Phenylteil durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl- oder Diphenyl-C₁-C₄-alkyl, wie Benzyl, 2,4-Dichlorbenzyl, 3,5-Ditrifluormethylbenzyl, 2-Phenylethyl oder 2,2-Diphenylethyl, unsubstituiertes oder im Phenyl durch Halogen und/oder Triazolyl substituiertes Phenoxy-C₁-C₄-alkyl, Pyridyl- oder Chinoliny-C₁-C₄-alkyl, wie 4-Chinoliny-methyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Benzoyl, wie Benzoyl, 3-Niederalkyl-, 3-Niederalkoxy-, 3-Halogen-, 3-Dimethylamino-, 3,5-Diniederalkyl-, 3,5-Diniederalkoxy-, 3,5-Dihalogen- oder 3,5-Ditrifluormethylbenzoyl, oder in zweiter Linie unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Naphthoyl, wie 1- oder 2-Naphthoyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Pyridylcarbonyl oder Chinoliny-carbonyl unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes 5-bis 7-gliedriges Cycloalkylcarbonyl, wie Cyclohexylcarbonyl, 3-Methyl-, 3-Methoxy-, 3-Chlor-, 3-Dimethylamino-, 3,5-Dimethyl-, 3,5-Dimethoxy-, 3,5-Dichlor- oder 3,5-Ditrifluormethylcyclohexylcarbonyl, unsubstituiertes oder im Phenyl durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl- oder Diphenyl-C₁-C₄-alkanoyl, wie 2,2-Diphenylacetyl oder 2,3-Diphenylpropionyl, unsubstituiertes oder im Phenylteil gegebenenfalls durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes N-Phenylcarbamoyl oder eine Gruppe der Formel Ia



darstellt, in der R₅ Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Mercapto, Amino, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Phenyl, Carboxy, Carbamoyl oder Ureido substituiertes C₁-C₄-Alkyl und R₆ C₂-C₇-Alkanoyl bedeutet, R₂ 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl oder einen unsubstituierten oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituierten Phenyl-, Naphthyl- oder Pyridylrest darstellt, R₃ für Wasserstoff, C₁-C₇-Alkyl, Carbamoyl, C₂-C₇-Alkanoyl, Carboxy-C₁-C₄-alkanoyl oder Carboxy-C₂-C₄-alkenoyl steht, R₄ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl oder Naphthyl oder unsubstituiertes Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, 2,3-Dihydroindolyl, Benzimidazolyl, Chinolyl oder 1,2,3,4-Tetrahydrochinoliny bedeutet, X₁ Methylen, Hydroxymethylen, C₁-C₄-Alkoxymethylen, Carbonyl oder Di-C₁-C₄-alkoxymethylen oder eine direkte Bindung darstellt, X₂ für C₁-C₇-Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung steht und X₃ Carbonyl, C₁-C₄-Alkylen, Carboxy-C₁-C₄-alkylen, C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl-C₁-C₄-alkylen, Carbamoyl-C₁-C₄-alkylen oder Hydroxymethyl-C₁-C₄-alkylen darstellt, und ihre Salze, Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemässen Verbindungen, diese enthaltende pharmazeutische Präparate und ihre Verwendung als Arzneimittelwirkstoffe.

Die genannten Aryl-, Aroyl-, Aralkanoyl-, Heteroaryl- und Heteroaroylreste können unsubstituiert oder mono-, di- oder trisubstituiert, insbesondere mono- oder disubstituiert, sein. Aryl-, Aralkyl-, Aryloxyalkyl-, Cycloalkylcarbonyl- und Aroylreste sind vorzugsweise in der angegebenen Weise mono- oder disubstituiert, wie 3-mono- oder 3,5-disubstituiert; Heteroaryl-, Heteroaralkyl-, Heteroaralkanoyl- und Heteroaroylreste sind vorzugsweise unsubstituiert.

Cycloalkyl ist beispielsweise 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, wie insbesondere Cyclohexyl oder in zweiter Linie Cyclopentyl oder Cycloheptyl.

Vor- und nachstehend sind unter niederen Resten und Verbindungen beispielsweise solche zu verstehen, die bis und mit 7, vorzugsweise bis und mit 4, Kohlenstoffatome (C-Atome) aufweisen.

Niederalkyl ist beispielsweise C₁-C₇-Alkyl, vorzugsweise C₁-C₄-Alkyl, wie insbesondere Methyl oder in zweiter Linie Ethyl, Propyl, Isopropyl oder Butyl, kann aber auch Isobutyl, Sekundärbutyl, Tertiärbutyl oder
5 eine C₅-C₇-Alkyl-, wie Pentyl-, Hexyl- oder Heptylgruppe sein.

Niederalkylen ist beispielsweise C₁-C₇-Alkylen, vorzugsweise C₁-C₄-Alkylen, wie Methylen, Ethylen, 1,3-Propylen, 1,4-Butylen oder 1,5-Pentylen.

Gegebenenfalls im Phenyl substituiertes Phenyl- oder Diphenylniederalkyl ist beispielsweise entsprechendes Phenyl- oder Diphenyl-C₁-C₄-alkyl, wie Benzyl, 2,4-Dichlorbenzyl, 3,5-Dinitrofluormethylbenzyl, 2-
10 Phenylethyl oder 2,2-Diphenylethyl.

Im Phenylteil gegebenenfalls substituiertes Phenyl- oder Diphenylniederalkanoyl ist beispielsweise entsprechendes Phenyl- oder Diphenyl-C₁-C₄-alkanoyl, wie 2,2-Diphenylacetyl oder 2,3-Diphenylpropionyl.

Gegebenenfalls im Phenyl substituiertes Phenoxy-niederalkyl ist beispielsweise durch Halogen und/oder Triazolyl substituiertes Phenoxy-C₁-C₄-alkyl, wie 2-[2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-4-chlor-phenoxy]ethyl.

15 Als Heteroarylrest 6-gliedriges monocyclisches oder aus einem 6-gliedrigen und einem 5- oder 6-gliedrigen Ring aufgebautes bicyclisches Azaheteroaryl aufweisendes Heteroarylniederalkyl ist beispielsweise Pyridyl- oder Chinoliny-C₁-C₄-alkyl, wie 4-Chinolinylmethyl.

Niederalkoxy ist beispielsweise C₁-C₇-Alkoxy, vorzugsweise C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy oder Butyloxy, kann aber auch Isobutyloxy, Sekundärbutyloxy, Tertiärbutyloxy oder eine
20 Pentyloxy-, Hexyloxy- oder Heptyloxygruppe sein.

Halogen ist beispielsweise Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor oder Fluor, ferner Brom.

Niederalkoxycarbonyl ist beispielsweise C₁-C₇-Alkoxycarbonyl, vorzugsweise C₁-C₄-Alkoxycarbonyl, wie Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propyloxycarbonyl, Isopropyloxycarbonyl oder Butyloxycarbonyl, kann aber auch Isobutyloxycarbonyl, Sekundärbutyloxycarbonyl, Tertiärbutyloxycarbonyl oder eine Pentyloxycar-
25 bonyl-, Hexyloxycarbonyl- oder Heptyloxycarbonylgruppe sein.

N-Niederalkylcarbamoyl ist beispielsweise N-C₁-C₇-Alkylcarbamoyl, vorzugsweise N-C₁-C₄-Alkylcarbamoyl, wie Methylcarbamoyl, Ethylcarbamoyl, Propylcarbamoyl, Isopropylcarbamoyl oder Butylcarbamoyl, kann aber auch Isobutylcarbamoyl, Sekundärbutylcarbamoyl, Tertiärbutylcarbamoyl oder eine Penty-car-
30 bamoyl-, Hexylcarbamoyl- oder Heptylcarbamoylgruppe sein.

N,N-Diniederalkylcarbamoyl ist beispielsweise N,N-Di-C₁-C₇-alkylcarbamoyl, vorzugsweise N,N-Di-C₁-C₄-alkylcarbamoyl, wie N,N-Dimethylcarbamoyl, N,N-Diethylcarbamoyl, N-Ethyl-N-methyl-carbamoyl, N,N-Dipropylcarbamoyl, N-Methyl-N-propyl-carbamoyl, N-Isopropyl-N-methyl-carbamoyl oder N-Butyl-N-methyl-carbamoyl, kann aber auch N-Isobutyl-N-methyl-carbamoyl, N-Methyl-N-sekundärbutyl-carbamoyl, N-Methyl-N-tertiärbutyl-carbamoyl oder eine N-Methyl-N-pentyl-carbamoyl-, N-Hexyl-N-methyl-carbamoyl- oder
35 N-Heptyl-N-methyl-carbamoylgruppe sein.

In höherer als der α -Stellung und in niedrigerer als der ω -Stellung durch Hydroxy substituiertes Niederalkylen ist beispielsweise 1,3-(2-Hydroxy)propylen, 1,4-(2-Hydroxy)butylen, 1,4-(3-Hydroxy)butylen, 1,5-(2-Hydroxy)pentylen, 1,5-(3-Hydroxy)pentylen oder 1,5-(4-Hydroxy)pentylen.

Durch Carboxy substituiertes Niederalkylen ist beispielsweise Carboxymethylen, 1- oder 2-Carboxyethylen, 1,3-(2-Carboxy)propylen, 1,4-(2-Carboxy)butylen, 1,4-(3-Carboxy)butylen, 1,5-(2-Carboxy)pentylen, 1,5-(3-Carboxy)pentylen oder 1,5-(4-Carboxy)pentylen.
40

Durch Niederalkoxycarbonyl substituiertes Niederalkylen ist beispielsweise Niederalkoxycarbonylmethylen, 1- oder 2-Niederalkoxycarbonylethylen, 1,3-(2-Niederalkoxycarbonyl)propylen, 1,4-(2-Niederalkoxycarbonyl)butylen, 1,4-(3-Niederalkoxycarbonyl)butylen, 1,5-(2-Niederalkoxycarbonyl)pentylen, 1,5-(3-Niederalkoxycarbonyl)pentylen oder 1,5-(4-Niederalkoxycarbonyl)pentylen, wobei Niederalkoxycarbonyl jeweils beispielsweise C₁-C₄-Alkoxycarbonyl, wie Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl oder Butoxycarbonyl, bedeutet.
45

Durch Carbamoyl, N-mono- oder N,N-Diniederalkylcarbamoyl substituiertes Niederalkylen ist insbesondere durch Carbamoyl substituiert und bedeutet beispielsweise Carbamoylmethylen, 1- oder 2-Carbamoylethylen, 1,3-(2-Carbamoyl)propylen, 1,4-(2-Carbamoyl)butylen, 1,4-(3-Carbamoyl)butylen, 1,5-(2-Carbamoyl)pentylen, 1,5-(3-Carbamoyl)pentylen oder 1,5-(4-Carbamoyl)pentylen.
50

Durch Hydroxymethyl substituiertes Niederalkylen ist beispielsweise 2-Hydroxyethyliden, 2,3-(1-Hydroxy)propylen, 1,3-(2-Hydroxymethyl)propylen, 2,4-(1-Hydroxy)butylen, 1,4-(2-Hydroxymethyl)butylen, 1,4-(3-Hydroxymethyl)butylen, 1,5-(2-Hydroxymethyl)pentylen, 1,5-(3-Hydroxymethyl)pentylen oder 1,5-(4-Hydroxymethyl)pentylen.
55

Niederalkoxymethylen ist beispielsweise C₁-C₄-Alkoxymethylen, wie Methoxymethylen, Ethoxymethylen, Propyloxymethylen oder Butyloxymethylen.

Diniederalkoxymethylen ist beispielsweise Di-C₁-C₄-alkoxymethylen, wie Dimethoxymethylen, Diethoxymethylen, Dipropoxymethylen oder Dibutyloxymethylen.

Niederalkylendiooxymethylen ist beispielsweise 5- bis 8-gliedriges, insbesondere 5- oder 6-gliedriges 1,3-Dioxacycloalk-2-yl, wie 1,3-Dioxacyclobut-2-yl, 1,3-Dioxacyclopent-2-yl (1,3-Dioxolan-2-yl), 1,3-Dioxacyclohex-2-yl (1,3-Dioxan-2-yl) oder 1,3-Dioxacyclohept-2-yl.

Die Verbindungen der Formel I weisen basischen oder, sofern R₃ und/oder X₃ durch Carboxy substituiert ist, amphoteren Charakter und können dementsprechend Säureadditionssalze und gegebenenfalls innere Salze bilden.

Säureadditionssalze von Verbindungen der Formel I sind beispielsweise deren pharmazeutisch verwendbare Salze mit geeigneten Mineralsäuren, wie Halogenwasserstoffsäuren, Schwefelsäure oder Phosphorsäure, z.B. Hydrochloride, Hydrobromide, Sulfate, Hydrogensulfate oder Phosphate, oder Salze mit geeigneten aliphatischen oder aromatischen Sulfonsäuren oder N-substituierten Sulfaminsäuren, z.B. Methansulfonate, Benzolsulfonate, p-Toluolsulfonate oder N-Cyclohexylsulfaminat (Cyclamate).

Zur Isolierung oder Reinigung können auch pharmazeutisch ungeeignete Salze Verwendung finden. Zur therapeutischen Anwendung gelangen nur die pharmazeutisch verwendbaren, nicht-toxischen Salze, die deshalb bevorzugt sind.

Die erfindungsgemäss bereitgestellten Verbindungen besitzen wertvolle pharmakologische Eigenschaften. Insbesondere zeigen sie eine ausgeprägte antagonistische Wirkung gegen Substanz P und weisen das für Substanz-P-Antagonisten typische Eigenschaftsspektrum auf. So wird durch die Verbindungen der Formel I und ihre pharmazeutisch verwendbaren Salze *in vitro* die Bindung von ³H-Substanz-P an der Rinder-Retina im Radiorezeptor-Assay nach H. Bittiger, Ciba Foundation Symposium 91, 196-199 (1982) in Konzentrationen ab etwa 10 µMol/L vollständig gehemmt. *In vivo* hemmen sie ab einer Dosis von etwa 0.01 mg/kg i.v. die durch Substanz-P bewirkte Gefässerweiterung am Meerschweinchenohr, gemessen in Anlehnung an die Versuchsanordnung von Andrews und Helme, Regul. Pept. 25, 267-275 (1989) sowie ab einer Dosis von etwa 1.0 mg/kg i.v. in Anlehnung an die Versuchsanordnung von Lundberg et al, Proc. Nat. Acad. Sci. (USA) 80, 1120-1124 vagal induzierte Bronchospasmen des Meerschweinchens, woraus sich ihre Eignung für die Behandlung von Asthma ergibt. Ihre Verwendbarkeit für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems ergibt sich beispielsweise aus ihrer Hemmwirkung auf durch *icv*-applizierten Substanz-P-methylester induzierte Verhaltensänderung der Rennmaus (gerbil) nach A. Vassout et al., Meeting on Substance P, Worcester, Mass (1990) mit einer ED₅₀ ab etwa 10 mg/kg s.c., ab etwa 30 mg/kg i.p. und ab etwa 100 mg/kg p.o.

Substanz P ist ein natürlich vorkommendes Undekapeptid der Tachykininfamilie. Es wird in Säugetierorganismus erzeugt und wirkt pharmakologisch als Neuropeptid. Substanz P spielt eine wesentliche Rolle bei verschiedenen Erkrankungen, beispielsweise bei Schmerzzuständen, bei Migräne und bei einigen Störungen des Zentralnervensystems, wie bei Angstzuständen, Schizophrenie und Depressionen sowie bei bestimmten motorischen Störungen, wie bei morbus Parkinson, aber auch bei entzündlichen Erkrankungen, wie bei rheumatoider Arthritis, Iritis und Konjunktivitis, bei Erkrankungen der Atmungsorgane, wie bei Asthma und chronischer Bronchitis, bei Erkrankungen des Gastrointestinalsystems, wie bei ulcerativer Colitis und morbus Crohn, und bei Hypertension.

Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, Substanz-P-Antagonisten zu entwickeln. Bei einer Reihe der bislang bekannten Substanz-P-Antagonisten handelt es sich jedoch um peptidische Verbindungen, die metabolisch zu labil sind, um als Arzneimittelwirkstoffe eingesetzt werden zu können.

Die erfindungsgemäss bereitgestellten Substanz-P-Antagonisten der Formel I und ihre pharmazeutisch verwendbaren Salze sind demgegenüber metabolisch stabil und eignen sich dementsprechend vorzüglich zur therapeutischen Behandlung der genannten Erkrankungen.

Die Erfindung betrifft in erster Linie Verbindungen der Formel I, worin R₁ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Benzoyl, Naphthoyl oder Phenyl-C₁-C₄-alkanoyl, unsubstituiertes Pyridylcarbonyl oder Chinolinylcarbonyl oder eine Gruppe der Formel Ia



darstellt, in der R₅ Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Mercapto, Amino, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Phenyl, Carboxy, Carbamoyl oder Ureido substituiertes C₁-C₄-Alkyl, beispiels-

weise Methyl, Isopropyl, Isobutyl, Sekundärbutyl, Hydroxymethyl, Mercaptomethyl, 2-Methylmercaptoethyl, 3-Ureidopropyl, 4-Aminobutyl, Carboxymethyl, Carbamoylmethyl, 2-Carboxyethyl, 2-Carbamoylethyl, Benzyl oder 4-Hydroxybenzyl, und R_6 C₂-C₇-Alkanoyl, wie Acetyl, Propionyl, Butyryl oder Pivaloyl, bedeutet, R_2 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, insbesondere Cyclohexyl oder in zweiter Linie Cyclopentyl oder Cycloheptyl, oder einen unsubstituierten oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituierten Phenyl-, Naphthyl- oder Pyridylrest darstellt, R_3 für Wasserstoff, C₁-C₇-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl oder Butyl, Isobutyl, Sekundärbutyl oder Tertiärbutyl, Carbamoyl, C₂-C₇-Alkanoyl, wie Acetyl, Propionyl, Butyryl oder Pivaloyl, Carboxy-C₁-C₄-alkanoyl, wie Succinoyl, Glutaroyl oder Adipoyl, oder Carboxy-C₃-C₅-alkenoyl, wie Maleyl, Fumaroyl oder Tartroyl, steht, R_4 unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl oder Naphthyl oder unsubstituiertes Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, Benzimidazolyl oder Chinolyl bedeutet, X_1 Methylen, Hydroxymethylen, C₁-C₄-Alkoxymethylen, wie Methoxymethylen, Ethoxymethylen, Propyloxymethylen oder Butyloxymethylen, Carbonyl, Di-C₁-C₄-alkoxymethylen, wie Dimethoxymethylen, Diethoxymethylen, Dipropyloxymethylen oder Dibutyloxymethylen, oder eine direkte Bindung darstellt, X_2 für C₁-C₇-Alkylen, wie Methylen oder in zweiter Linie Ethylen oder 1,3-Propylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung steht und X_3 Carbonyl, C₁-C₄-Alkylen, wie Methylen, Ethylen oder 1,3-Propylen, Carboxy-C₁-C₄-alkylen, wie 1,3-(2-Carboxy)propylen, 1,4-(2-Carboxy)butylen, 1,4-(3-Carboxy)butylen, C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl-C₁-C₄-alkylen, wie 1,3-(2-C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl)propylen, 1,4-(2-C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl)butylen, 1,4-(3-C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl)butylen, 1,5-(2-C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl)pentylen, 1,5-(3-C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl)pentylen oder 1,5-(4-C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl)pentylen, wobei C₁-C₄-Alkoxy-carbonyl jeweils beispielsweise Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl oder Butoxycarbonyl, bedeutet, Carbamoyl-C₁-C₄-alkylen, wie 1,3-(2-Carbamoyl)propylen, 1,4-(2-Carbamoyl)butylen, 1,4-(3-Carbamoyl)butylen, 1,5-(2-Carbamoyl)pentylen, 1,5-(3-Carbamoyl)pentylen oder 1,5-(4-Carbamoyl)pentylen, oder Hydroxymethyl-C₁-C₄-alkylen, wie 1,3-(2-Hydroxymethyl)propylen, 1,4-(2-Hydroxymethyl)butylen, 1,4-(3-Hydroxymethyl)butylen, 1,5-(2-Hydroxymethyl)pentylen, 1,5-(3-Hydroxymethyl)pentylen oder 1,5-(4-Hydroxymethyl)pentylen, darstellt, und ihre Salze.


Die Erfindung betrifft vorzugsweise Verbindungen der Formel I, worin R_1 unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor, und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl oder Phenyl-C₁-C₄-alkanoyl bedeutet, R_2 unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor, und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl oder unsubstituiertes Pyridyl darstellt, R_3 für Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, Propyl oder Isopropyl, Carbamoyl oder C₂-C₇-Alkanoyl, wie Acetyl, Propionyl, Butyryl oder Pivaloyl, steht, R_4 unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor, und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl oder unsubstituiertes Naphthyl, Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, Benzimidazolyl oder Chinolyl bedeutet, X_1 Methylen, Hydroxymethylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung darstellt, X_2 für eine direkte Bindung steht und X_3 C₁-C₄-Alkylen, wie Methylen oder in zweiter Linie Ethylen oder 1,3-Propylen, darstellt, und ihre Salze.

Die Erfindung betrifft in allererster Linie Verbindungen der Formel I, worin R_1 unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor, und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl bedeutet, R_2 unsubstituiertes oder durch Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor, und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl darstellt, R_3 für Wasserstoff steht, R_4 unsubstituiertes Chinolyl bedeutet, X_1 Methylen darstellt, X_2 für eine direkte Bindung steht und X_3 C₁-C₄-Alkylen, wie Methylen oder in zweiter Linie Ethylen oder 1,3-Propylen, darstellt, und ihre Salze.


Die Erfindung betrifft namentlich die in den Beispielen genannten Verbindungen der Formel I und ihre Salze.

Die Erfindung betrifft ferner ein auf an sich bekannten Methoden beruhendes Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemässen Verbindungen. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass man

a) in eine Verbindung der Formel II



worin R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, den Rest R_1 einführt oder
b) Verbindungen der Formeln III und IV




und




worin Y_1 eine Gruppe der Formel $-N(R_3)-H$ und Y_2 Hydroxy, reaktionsfähiges verestertes Hydroxy oder, sofern X_3 für Carbonyl steht, verethertes Hydroxy darstellt oder Y_1 Hydroxy, reaktionsfähig verestertes Hydroxy oder, sofern X_2 Carbonyl bedeutet, verethertes Hydroxy und Y_2 eine Gruppe der Formel $-N(R_3)-H$ darstellt, wobei R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder deren Salze miteinander kondensiert oder

c) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin einer der Reste X_2 und X_3 Alkylen und der andere Alkylen, Carbonyl oder im Falle von X_2 eine direkte Bindung bzw. im Falle von X_3 einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest darstellt, in einer Verbindung der Formel V




worin Z_1 einen in α -Stellung zur Gruppe $-N(R_3)-$ durch Oxo oder Hydroxy substituierten Alkylenrest und Z_2 Alkylen, Carbonyl oder einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest bedeutet oder Z_1 Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung und Z_2 in α -Stellung zur Gruppe $-N(R_3)-$ durch Oxo oder Hydroxy substituierten Alkylenrest darstellt und R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder in einem Salz davon die Oxo- bzw. Hydroxygruppe in α -Stellung zur Gruppe $-N(R_3)-$ reduktiv durch Wasserstoff ersetzt bzw. in einer Verbindung der Formel VI



worin Z_3 einen Rest der Formel $-C(R_a)=C(R_b)-$ und Z_4 Alkylen, Carbonyl oder einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest bedeutet oder Z_3 Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung und Z_4 einen Rest der Formel $-C(R_a)=C(R_b)-$ bedeutet, wobei R_a und R_b jeweils Wasserstoff oder Niederalkyl bedeuten, den Rest der Formel $-C(R_a)=C(R_b)-$ durch Reduktion der Doppelbindung zu dem entsprechenden Rest $-\text{CH}(R_a)-\text{CH}(R_b)-$ reduziert oder


d) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin X_1 eine Carbonyl- oder Hydroxymethylengruppe bedeutet, Verbindungen der Formeln VII und VIII




und

 $\text{Y}_4 - \text{R}_2 \quad (\text{VIII}),$

worin einer der Reste Y_3 und Y_4 Formyl oder eine gegebenenfalls anhydridisierte oder veresterte Carboxygruppe und der andere einen metallischen Rest darstellt und R_2 , R_3 , R_4 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, miteinander kondensiert oder
e) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin R_3 für Wasserstoff steht, aus einer Verbindung der Formel IX



worin Y_5 eine Aminoschutzgruppe bedeutet und R_2 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder aus einem Salz davon die Gruppe Y_5 abgespalten oder
f) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin X_3 Alkylen bedeutet, Verbindungen der Formeln X und XI



worin Y_6 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$, Y_7 Wasserstoff, Y_8 und Y_9 gemeinsam Oxo und Z_5 einen X_3 entsprechenden Alkanylylidenrest bedeuten oder Y_6 und Y_7 gemeinsam Oxo, Y_8 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$, Y_9 Wasserstoff und Z_5 einen Rest X_3 darstellt, unter reduzierenden Bedingungen miteinander kondensiert und gegebenenfalls eine erhaltene Verbindung in eine andere Verbindung der Formel I überführt, ein verfahrensgemäss erhältliches Isomerengemisch in die Komponenten auf trennt und das jeweils bevorzugte Isomere abtrennt und/oder eine verfahrensgemäss erhältliche freie Verbindung in ein Salz oder eine verfahrensgemäss erhältliche Salz in die entsprechende freie Verbindung überführt.

Die Durchführung der verfahrensgemässen Reaktionen sowie die Herstellung neuer Ausgangsstoffe bzw. Zwischenprodukte erfolgt in Analogie zur Reaktions- und Bildungsweise bekannter Ausgangsstoffe bzw. Zwischenprodukte. Dabei werden, auch wenn nachstehend nicht ausdrücklich erwähnt, die jeweils üblichen Hilfsmittel, wie Katalysatoren, Kondensations- sowie Solvolysenmittel und/oder Lösungs- bzw.

Verdünnungsmittel, und Reaktions-, wie Temperatur- und Druckbedingungen, sowie gegebenenfalls Schutzgase verwendet.


Die Einführung des Restes R_1 gemäss der Verfahrensvariante a) erfolgt in üblicher Weise, beispielsweise durch Umsetzung mit einem den Rest R_1 einführenden Mittel, wie einem N-Acylierungsmittel der Formel R_1-Y_a (IIa1), worin R_1 einen gegebenenfalls substituierten Aryl-, Heteroaryl-, Cycloalkylcarbonyl-, Alkanoyl-, Heteroarylalkanoyl- oder Arylcarbamoylrest oder den Acylrest einer gegebenenfalls N-alkanoylierten α -Aminosäure und Y_a gegebenenfalls verethertes Hydroxy, wie Hydroxy, Niederalkoxy oder gegebenenfalls substituiertes Phenoxy, oder reaktionsfähiges verestertes Hydroxy, wie Halogen, insbesondere Chlor, oder

einen Rest der Formel $-O-R_1$, bedeutet, bzw. mit einem Aralkylierungs-, Aryloxyalkylierungs- oder Heteroarylalkylierungsmittel der Formel R_1-Y_b (IIa2), worin R_1 einen gegebenenfalls substituierten Aralkyl-, Aryloxyalkyl-, Heteroaralkylrest und Y_b reaktionsfähiges verestertes Hydroxy, wie Halogen, z.B. Chlor, Brom oder Jod, oder eine Sulfonyloxygruppe, wie eine Alkan- oder gegebenenfalls substituierte Benzolsulfonyloxygruppe, z.B. Methan-, Ethan-, Benzol-, p-Toluol- oder p-Brombenzolsulfonyloxy, bedeutet, oder durch Umsetzung unter reduzierenden Bedingungen mit einer Verbindung der Formel $R_1=O$ (IIa3), worin R_1 einen gegebenenfalls substituierten Aralkyl-, Aryloxyalkyl-, Heteroaralkylrest bedeutet.


Erforderlichenfalls arbeitet man unter thermischer Zersetzung intermediär gebildeter Ammoniumsalze oder in Gegenwart eines Kondensationsmittels, wie eines wasserbindenden Mittels, oder basischen Kondensationsmittels, und in Gegenwart eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels. So wird die Umsetzung mit Säuren der Formel IIa1 ($Y = COOH$) vorzugsweise in Gegenwart eines wasserbindenden Mittels, wie von N,N-Dicyclohexylcarbodiimid, oder unter thermischer Zersetzung des primär gebildeten Ammoniumsalzes vorgenommen, während die Umsetzung mit Säureanhydriden der Formel IIa1 ($Y = \text{Halogen oder } -O-(C=O)-R_1$) und mit Verbindungen der Formel IIa2 vorzugsweise in Gegenwart eines basischen Kondensationsmittels, wie eines Alkalimetallhydroxides oder -carbonates, oder eines tertiären oder sterisch gehinderten sekundären organischen Amins, wie eines Triniederalkylamins, z.B. von Triethylamin oder Diisopropylamin, oder einer aromatischen Stickstoffbase, z.B. von Pyridin, durchgeführt wird.

Bei der Umsetzung mit Verbindungen der Formel IIa3 arbeitet man beispielsweise in Gegenwart von Wasserstoff und eines Hydrierungskatalysators, wie eines Platin- oder Palladiumkatalysators oder von Raney-Nickel, bzw. in Gegenwart eines Dileichtmetallhydrides, wie Natriumborhydrid oder Natriumcyanoborhydrid, vorzugsweise in einem unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittels, wie eines Niederalkanols, wie Methanol oder Ethanol, oder eines Diniederalkyl- oder Niederalkylenethers, wie Diethylether, Dioxan oder Tetrahydrofuran.

Die Ausgangsstoffe der Formel II können in üblicher Weise hergestellt werden, beispielsweise indem man Verbindungen der Formeln



und




miteinander umsetzt, beispielsweise wie nachstehend unter der Verfahrensvariante b) beschrieben.

In Ausgangsstoffen der Formel III oder IV gemäß der Verfahrensvariante b) bedeutet reaktionsfähiges verestertes Hydroxy beispielsweise ein Halogen-, wie Chlor-, Brom- oder Jodatome, oder, sofern X_3 von Carbonyl verschieden ist, eine Sulfonyloxygruppe, z.B. Methansulfonyloxy oder p-Toluolsulfonyloxy, oder sofern X_3 Carbonyl bedeutet, eine Gruppe der Formel $-O-(C=O)-R_4$. Verestertes Hydroxy bedeutet beispielsweise Niederalkoxy, wie Methoxy oder Ethoxy, oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl- oder Aryloxy.

Die Umsetzung von Verbindungen der Formeln III und IV erfolgt in üblicher Weise, beispielsweise unter thermischer Zersetzung intermediär gebildeter Ammoniumsalze oder in Gegenwart eines Kondensationsmittels, wie eines wasserbindenden Mittels, oder basischen Kondensationsmittels, und in Gegenwart eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels. So wird die Umsetzung mit Säuren der Formel IV bzw. III (Y_2 bzw. $Y_1 = OH$) vorzugsweise in Gegenwart eines wasserbindenden Mittels, wie von N,N-Dicyclohexylcarbodiimid, oder unter thermischer Zersetzung des primär gebildeten Ammoniumsalzes vorgenommen, während die Umsetzung mit reaktionsfähigen Estern der Formel IV bzw. III (Y_2 bzw. $Y_1 = \text{reaktionsfähiges verestertes Hydroxy}$) bzw. mit Säureanhydriden der Formel IV bzw. III (Y_2 bzw. $Y_1 = \text{anhydridisiertes Hydroxy}$) vorzugsweise in Gegenwart eines basischen Kondensationsmittels, wie eines Alkalimetallhydroxides oder -carbonates, oder eines tertiären oder sterisch gehinderten sekundären organischen Amins, wie eines Triniederalkylamins, z.B. von Triethylamin oder Diisopropylamin, oder einer aromatischen Stickstoffbase, z.B. von Pyridin, durchgeführt wird.

Die Ausgangsstoffe der Formel III können in üblicher Weise hergestellt werden, beispielsweise indem man in eine Verbindung der Formel IIIa




den Rest R_1 einführt, beispielsweise wie vorstehend unter der Verfahrensvariante a) beschrieben.


Der reduktive Ersatz der Oxo- bzw. Hydroxygruppe in α -Stellung zur Gruppe $-\text{N}(\text{R}_3)-$ durch Wasserstoff bzw. die Reduktion der Doppelbindung in dem Rest der Formel $-\text{C}(\text{R}_a)=\text{C}(\text{R}_b)-$ gemäss der Verfahrensvariante c) erfolgt beispielsweise durch katalytische Hydrierung, d.h. Behandlung mit Wasserstoff in Gegenwart eines Hydrierungskatalysators, wie eines Metalles oder einer Metallverbindung eines Metalles der Gruppe VIIIb des Periodischen Systems, wie von Platin, Platinoxid, Palladium/Kohle oder von Raney-Nickel, oder durch Umsetzung mit einem Dileichtmetallhydrid, wie einem Alkalimetallborhydrid, z.B. mit Natriumcyano-

borhydrid, oder durch Behandlung mit Ameisensäure.


Ausgangsstoffe der Formel V bzw. VI können beispielsweise durch Kondensation von Verbindungen der Formeln Va und Vb



und



worin Z_1' eine direkte Bindung oder einen um ein C-Atom verkürzten Rest X_2 und Y_1' Wasserstoff, Niederalkyl oder freies, verethertes oder reaktionsfähiges verestertes Hydroxy bedeutet und Z_2 die angegebene Bedeutung hat, oder von Verbindungen der Formel VIa und VIb




worin Z_1 die angegebene Bedeutung hat, Z_2' eine direkte Bindung oder einen um ein C-Atom verkürzten Rest X_3 und Y_2' Wasserstoff, Niederalkyl oder freies, verethertes oder reaktionsfähiges verestertes Hydroxy bedeutet, erhalten werden. Ist in Verbindungen der Formel Va Y_1' bzw. in Verbindungen der Formel VIb Y_2' Wasserstoff oder Niederalkyl, werden dabei unter milden Reaktionsbedingungen, insbesondere im basischen oder neutralen Milieu, die entsprechenden Verbindungen der Formel V und unter drastischen Reaktionsbedingungen, insbesondere im sauren Milieu, die entsprechenden Verbindungen der Formel VI gebildet. Im letztgenannten Fall werden dabei intermediär die entsprechenden Verbindungen der Formel V gebildet, aus denen dann durch Wasserabspaltung die entsprechenden Verbindungen der Formel VI gebildet werden. Ausgangsstoffe der Formeln V und VI können auch nebeneinander entstehen. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Zwischenprodukte der Formel V bzw. VI in situ gebildet und ohne Isolierung zu den entsprechenden Verbindungen der Formel I reduziert, indem man die Kondensation von Ausgangsstoffen der Formeln Va und Vb bzw. VIa und VIb in Gegenwart eines der genannten Reduktionsmittel vornimmt.


In Ausgangsstoffen der Formel VII bzw. VIII für die Verfahrensvariante d) bedeutet gegebenenfalls anhydridisiertes oder verestertes Carboxy Y_3 bzw. Y_4 beispielsweise Halogencarbonyl oder in Falle von Y_4 eine Gruppe der Formel $\text{R}_2\text{---C}(=\text{O})\text{---O-}$ und ein metallischer Rest Y_3 bzw. Y_4 beispielsweise ein Alkalimetallatom oder eine Gruppe der Formel $-\text{M}^{\text{II}}/2$ oder $\text{M}^{\text{II}}\text{---Hal}$, worin M^{II} ein Metallatom der Gruppe IIb des Periodischen Systems der Elemente, wie Mg oder Zn, bedeutet.

Die Umsetzung von Verbindungen der Formeln VII und VIII erfolgt in üblicher Weise, beispielsweise in einem etherartigen Lösungsmittel, wie einem aliphatischen oder cycloaliphatischen Ether, z.B. in Diethylether, Methoxybutan, Dibutylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan.

Ausgangsstoffe der Formel VII, worin Y_3 Formyl oder gegebenenfalls anhydridisiertes oder verestertes Carboxy bedeutet, werden beispielsweise hergestellt, indem man Verbindungen der Formeln VIIa und VIIa




und



worin Y_1 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$ und Y_2 Hydroxy, reaktionsfähiges verestertes Hydroxy oder, sofern X_3 für Carbonyl steht, verethertes oder anhydridisiertes Hydroxy darstellt oder Y_1 Hydroxy, reaktionsfähig verestertes Hydroxy oder, sofern X_2 Carbonyl bedeutet, verethertes oder anhydridisiertes Hydroxy und Y_2 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$ darstellt, wobei R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder deren Salze miteinander kondensiert, beispielsweise wie unter der Verfahrensvariante b) angegeben.


Ausgangsstoffe der Formeln VII bzw. VIII, worin Y_3 bzw. Y_4 einen metallischen Rest bedeutet, werden vorzugsweise in situ hergestellt, indem man eine Verbindung der Formel VIIb



worin Y_3 ein Halogenatom, insbesondere Chlor, Brom oder Jod, bedeutet, mit einem Metall der Formel M^{II} umgesetzt bzw. ausgehend von Verbindungen der Formel $Y'_4 - \text{R}_2$ (VIIIb), worin Y'_4 Wasserstoff oder ein Halogenatom, insbesondere Chlor, Brom oder Jod, bedeutet, eine Verbindung der Formel VIIIb, worin Y'_4 Wasserstoff ist mit einer metallorganischen Verbindung, beispielsweise einem Metallderivat eines aliphatischen Kohlenwasserstoffes, z.B. mit Butyllithium, bzw. eine Verbindung der Formel VIIIb, worin Y'_4 ein Halogenatom bedeutet, mit einem Metall der Formel M^{II} umgesetzt.

In Ausgangsstoffen der Formel IX gemäß der Verfahrensvariante e) ist die Aminoschutzgruppe Y_5 beispielsweise eine gegebenenfalls halogenierte Niederalkanoylgruppe, wie Trifluoracetyl, oder eine von einem Halbester der Kohlensäure abgeleitete Acylgruppe, wie eine Niederalkoxycarbonyl- oder α -Phenyl-niederalkoxycarbonylgruppe, z.B. Tertiärbutyloxycarbonyl oder Benzyloxycarbonyl, oder eine Silylgruppe, wie Triniederalkylsilyl, z.B. Trimethylsilyl. Die Abspaltung der Aminoschutzgruppe erfolgt in üblicher Weise, beispielsweise durch Säurebehandlung, oder ausgehend von Verbindungen IX, worin Y_5 halogeniertes Niederalkanoyl, wie Trifluoracetyl, ist, durch reduktive Abspaltung, beispielsweise durch Behandeln mit einem Dileichtmetallhydrid, wie Natriumborhydrid, vorzugsweise in einem Niederalkanol, wie Methanol.

Die Ausgangsstoffe der Formel IX können beispielsweise in Analogie zur Verfahrensvariante a) hergestellt werden, wobei man von entsprechenden Verbindungen der Formel IXa




ausgeht.

Die Umsetzung von Verbindungen der Formeln X und XI gemäss der Verfahrensvariante f) erfolgt beispielsweise durch Wasserabspaltung, beispielsweise durch azeotrope Destillation, insbesondere mit Toluol, und anschliessende Reduktion mit Boran oder einem Dileichtmetallhydrid, wie einem Alkalimetall-

borhydrid, z.B. mit Natriumboratan oder Natriumcyanoborhydrid.
Ausgangsstoffe der Formel X, worin R₁ eine der unter Formel I genannten Acylreste, X₁ Hydroxymethylen darstellt und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, und ihre pharmazeutisch verwendbaren Salze weisen die gleichen pharmakologischen Eigenschaften und vergleichbare Wirkungsstärke auf wie die Endstoffe der Formel I.

Die Erfindung betrifft dementsprechend auch 1-Acylpiperidone der Formel X




worin R₁ einen gegebenenfalls substituierten Aroyl-, Heteroaroyl-, Cycloalkylcarbonyl-, Alkanoyl-, Heteroaralkyl-, Alkoxycarbonyl- oder Arylcarbamoylrest oder den Acylrest einer gegebenenfalls durch Niederalkanoyl oder Carbamoylniederalkanoyl N-substituierten α -Aminosäure bedeutet, R₂ Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten Aryl- oder Heteroaroylrest darstellt, X₁ Hydroxymethylen darstellt und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, und ihre Salze, Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemässen Verbindungen der Formel X, diese enthaltende pharmazeutische Präparate und ihre Verwendung als Arzneimittelwirkstoffe.

Dabei hat die Variable R₂ vorzugsweise die für die Verbindungen der Formel I, vorzugsweise die vorstehend für besonders bevorzugte Verbindungen der Formel I, angegebene Bedeutung.

Die Erfindung betrifft in allererster Linie diejenigen Verbindungen der Formel X, worin R₁ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, wie Methyl, C₁-C₄-Alkoxy, wie Methoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor, und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl bedeutet, R₂ unsubstituiertes oder durch Halogen der Atomnummer bis und mit 35, wie Chlor, und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl darstellt, X₁ Hydroxymethylen darstellt und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, und ihre Salze.

Die Erfindung betrifft namentlich die in den Beispielen genannten Verbindungen der Formel X und ihre Salze.

Die erfindungsgemässen Verbindungen der Formel X, worin R₁ und R₂ die angegebenen Bedeutungen haben, X₁ Hydroxymethylen darstellt und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, und ihre Salze werden nach an sich bekannten Methoden hergestellt. Das erfindungsgemässe Verfahren zu ihrer Herstellung ist dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel Xa



mit einem den Rest R₁ einführendem Mittel kondensiert und gewünschtenfalls eine erhaltene Verbindung in eine andere Verbindung der Formel I überführt, ein verfahrensgemäss erhältliches Isomerengemisch in die Komponenten auftrennt und das jeweils bevorzugte Isomere abtrennt und/oder eine verfahrensgemäss erhältliche freie Verbindung in ein Salz oder eine verfahrensgemäss erhältliche Salz in die entsprechende freie Verbindung überführt.


Als den Rest R₁ einführende Mittel kommen beispielsweise Verbindungen der Formel R₁-Y₁₀ (Xb) in Betracht, worin Y₁₀ reaktionsfähiges verestertes Hydroxy, wie Halogen oder eine Sulfonyloxygruppe, wie Benzol-, p-Toluol- oder Methansulfonyloxy, oder sofern R₁ Aroyl-, Heteroaroyl-, Cycloalkylcarbonyl-, Alkanoyl-, Heteroaralkyl-, Alkoxycarbonyl- oder Arylcarbamoylrest oder den Acylrest einer gegebenenfalls durch Niederalkanoyl oder Carbamoylniederalkanoyl N-substituierten α -Aminosäure bedeutet, verether-

tes Hydroxy, wie Niederalkoxy oder gegebenenfalls, beispielsweise durch Halogen und/oder Nitro, substituiertes Phenoxy, darstellt.


Die Umsetzung erfolgt in üblicher Weise, beispielsweise in Gegenwart eines basischen Kondensationsmittels, wie eines Alkalimetallhydrogencarbonates, z.B. von Natriumhydrogencarbonat, vorzugsweise in einem wasserhaltigen Zweiphasensystem, z.B. in Methylenchlorid/Wasser.

Verbindungen der Formel Xa können ihrerseits hergestellt werden durch Umsetzung eines N-geschützten Piperidin-4-onketals, z.B. von 1-(Tertiärbutyloxycarbonyl)piperidin-4-on-ethylenketal, mit einem Aldehyd der Formel $R_2-CH=O$ (Xc), beispielsweise in Gegenwart einer Metall-, wie Alkalimetallkohlenwasserstoffverbindung, vorzugsweise einer Niederalkyllithiumverbindung, z.B. von Sekundärbutyllithium, insbesondere in einem etherartigen Lösungsmittel, wie in Diethylether, bei -30° bis -80° C, z.B. bei -60° bis -75° C.


Verbindungen der Formel X, worin Y_6 eine Gruppe der Formel $-N(R_3)-H$ und Y_7 Wasserstoff bedeutet, werden beispielsweise hergestellt, indem man eine Verbindung der Formel R_2-X_1-Y (Xd), worin Y reaktionsfähiges verestertes Hydroxy, wie Halogen, Niederalkansulfonyloxy oder gegebenenfalls substituiertes Benzolsulfonyloxy bedeutet, in Gegenwart eines Alkalimetallniederalkanolates, wie Natriummethanolat, in einem Niederalkanol, wie Methanol, oder in Gegenwart von Natriumamid in Toluol mit einem But-2-en-1,1-dicarbonsäureniederalkylester der Formel $CH_2=CH-CH_2-CH(COOR)_2$ (Xe; R = Niederalkyl) kondensiert, das Reaktionsprodukt der Formel Xf




25 durch Behandlung mit einem Alkalimetallhydroxid, z.B. mit Kaliumhydroxid in wässrigem Methanol, verseift und decarboxyliert, die erhaltene Säure der Formel Xg




35 z.B. durch Behandeln mit einem Halogenierungsmittel, wie Oxalylchlorid oder Thionylchlorid, und nachfolgende Umsetzung mit Ammoniak amidiert und anschliessend zum entsprechenden Amin der Formel Xh



45 abbaut, dieses nach Schutz der Aminogruppe, beispielsweise durch Acylierung, mit einem Niederalkoxymethylhalid der Formel $RO-CH_2-Hal$ (Xi; R = Niederalkyl; Hal = Halogen), z.B. mit Chlordimethylether in Gegenwart von Natriumhydroxid in Dichlormethan/Wasser, kondensiert, das Reaktionsprodukt der Formel Xi



durch Säurebehandlung, beispielsweise Behandlung mit einer Lewissäure, wie Zinntetrachlorid, Eisen-III-chlorid, Titan-tetrachlorid, oder Protonensäure, wie Schwefelsäure, Chlorsulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure oder Trifluormethylsäure oder -methansulfonsäure, in Acetonitril und erforderlichenfalls Acetanhydrid und einem weiteren Lösungsmittel, wie Dichlormethan, Benzol oder Toluol, zur entsprechenden N-geschützten Verbindung der Formel Xj



15 cyclokondensiert, die Aminoschutzgruppe abspaltet, gewünschtenfalls ein erhaltenes Racemat in die Enantiomeren auf trennt, in üblicher Weise die Gruppe R₁, beispielsweise wie vorstehend für die Herstellung von Verbindungen der Formel X, worin X₁ Hydroxymethylen und Y₆ gemeinsam mit Y₇ Oxo darstellt, beschrieben, einführt und die Aminoschutzgruppe durch Säurebehandlung, beispielsweise mit 6N-Salzsäure, abspaltet.

20 Verfahrensgemäss erhältliche Verbindungen können in üblicher Weise in andere Verbindungen der Formel I überführt werden.

25 So kann man Verbindungen der Formel I, worin X₁ Carbonyl bedeutet, in üblicher Weise zu den entsprechenden Verbindungen der Formel I reduzieren, worin X₁ für Hydroxymethylen steht, beispielsweise wie unter der Verfahrensvariante c) bzw. für die Herstellung von Zwischenprodukten der Formeln V und VI beschrieben. In analoger Weise können auch erhaltene Verbindungen der Formel I, worin X₁ Hydroxymethylen oder X₂ und/oder X₃ Carbonyl bedeutet, zu den entsprechenden Verbindungen der Formel I reduziert werden, worin X₁, X₂ und/oder X₃ Methylen darstellt.

30 In erhaltenen Verbindungen der Formel I, worin X₁ ketalisiertes Carbonyl bedeutet, kann die Carbonylgruppe in üblicher Weise, beispielsweise durch Säurebehandlung, freigesetzt werden. Umgekehrt kann Carbonyl X₁ durch Umsetzung mit einem entsprechenden Alkohol, wie ein Niederalkanol oder einem Niederalkandiol, ketalisiert werden.

35 Ferner kann man in erhaltenen Verbindungen der Formel I, worin R₃ Wasserstoff bedeutet, einen von Wasserstoff verschiedenen Rest R₃ einführen, Alkyl beispielsweise durch übliche Alkylierung, Carbamoyl beispielsweise durch Kondensation mit Isocyansäure oder einem Carbamoylhalogenid und gegebenenfalls wie angegeben substituiertes Alkanoyl bzw. Alkenoyl durch übliche Acylierung. Umgekehrt kann man in erhaltenen Verbindungen der Formel I, worin R₃ Alkyl, insbesondere Methyl, ist, die Alkylgruppe durch Behandlung mit einem Halogenameisensäureester, wie -methylester, abspalten.

40 Weiterhin kann man in erhaltenen Verbindungen der Formel I verestertes oder amidiertes Carboxy als Substituent von Alkanoyl bzw. Alkenoyl R₃ oder von Alkylen X₃ zu Carboxy hydrolysieren bzw. umgekehrt freies Carboxy verestern bzw. amidieren.

45 Erhaltene Salze können in an sich bekannter Weise in die freien Verbindungen umgewandelt werden, z.B. durch Behandeln mit einer Base, wie einem Alkalimetallhydroxid, einem Metallcarbonat oder -hydrogencarbonat, oder Ammoniak, oder einer anderen eingangs genannten salzbildenden Base bzw. mit einer Säure, wie einer Mineralsäure, z.B. mit Chlorwasserstoff, oder einer anderen eingangs genannten salzbildenden Säure.

50 Erhaltene Salze können in an sich bekannter Weise in andere Salze überführt werden, Säureadditionssalze z.B. durch Behandeln mit einem geeigneten Metallsalz, wie einem Natrium-, Barium- oder Silbersalz, einer anderen Säure in einem geeigneten Lösungsmittel, in welchem ein sich bildendes anorganisches Salz unlöslich ist und damit aus dem Reaktionsgleichgewicht ausscheidet, und Basesalze durch Freisetzung der freien Säure und erneute Versalzung.

Die Verbindungen der Formel I, einschliesslich ihrer Salze, können auch in Form von Hydraten erhalten werden oder das zur Kristallisation verwendete Lösungsmittel einschliessen.

55 Infolge der engen Beziehung zwischen den neuen Verbindungen in freier Form und in Form ihrer Salze sind vorstehend und nachfolgend unter den freien Verbindungen und ihren Salzen sinn- und zweckgemäss gegebenenfalls auch die entsprechenden Salze bzw. freien Verbindungen zu verstehen.

Erhaltene Diastereomerengemische und Racematgemische können auf Grund der physikalisch-chemischen Unterschiede der Bestandteile in bekannter Weise in die reinen Diastereomeren bzw. Racemate

aufgetrennt werden, beispielsweise durch Chromatographie und/oder fraktionierte Kristallisation.

Erhaltene Racemate lassen sich ferner nach bekannten Methoden in die optischen Antipoden zerlegen, beispielsweise durch Umkristallisation aus einem optisch aktiven Lösungsmittel, mit Hilfe von Mikroorganismen oder durch Umsetzung des erhaltenen Diastereomergemisches bzw. Racemates mit einer optisch aktiven Hilfsverbindung, z.B. entsprechend der in Verbindungen der Formel I enthaltenen sauren, basischen oder funktionell abwandbaren Gruppen mit einer optisch aktiven Säure, Base oder einem optisch aktiven Alkohol, in Gemische diastereomerer Salze bzw. funktioneller Derivate, wie Ester, Trennung derselben in die Diastereomeren, aus denen das jeweils gewünschte Enantiomere in der jeweils üblichen Weise freigesetzt werden kann. Dafür geeignete Basen, Säuren bzw. Alkohole sind beispielsweise optisch aktive Alkaloidbasen, wie Strychnin, Cinchonin oder Brucin, oder D- oder L-(1-Phenyl)ethylamin, 3-Pipecolin, Ephedrin, Amphetamin und ähnliche synthetisch zugängliche Basen, optisch aktive Carbon- oder Sulfonsäuren, wie Chinasäure oder D- oder L-Weinsäure, D- oder L-Di-o-toluyweinsäure, D- oder L-Äpfelsäure, D- oder L-Mandelsäure, oder D- oder L-Camphersulfonsäure, bzw. optisch aktive Alkohole, wie Borneol oder D- oder L-(1-Phenyl)ethanol.

Die Erfindung betrifft auch diejenigen Ausführungsformen des Verfahrens, nach denen man von einer auf irgendeiner Stufe des Verfahrens als Zwischenprodukt erhältlichen Verbindung ausgeht und die fehlenden Schritte durchführt oder einen Ausgangsstoff in Form eines Salzes verwendet oder insbesondere unter den Reaktionsbedingungen bildet.

Die neuen Ausgangsstoffe, die speziell für die Herstellung der erfindungsgemässen Verbindungen entwickelt wurden, insbesondere die zu den eingangs als bevorzugt gekennzeichneten Verbindungen der Formel I führende Ausgangsstoffauswahl, die Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Zwischenprodukte bilden ebenfalls einen Gegenstand der Erfindung.

Die neuen Verbindungen der Formel I können z.B. in Form pharmazeutischer Präparate Verwendung finden, welche eine therapeutisch wirksame Menge der Aktivsubstanz, gegebenenfalls zusammen mit anorganischen oder organischen, festen oder flüssigen, pharmazeutisch verwendbaren Trägerstoffen enthalten, die sich zur enteralen, z.B. oralen, oder parenteralen Verabreichung eignen. So verwendet man Tabletten oder Gelatinekapseln, welche den Wirkstoff zusammen mit Verdünnungsmitteln, z.B. Lactose, Dextrose, Saccharose, Mannit, Sorbit, Cellulose und/oder Schmiermitteln, z.B. Kieselerde, Talk, Stearinsäure oder Salzen davon, wie Magnesium- oder Calciumstearat, und/oder Polyethylenglykol, aufweisen. Tabletten können ebenfalls Bindemittel, z.B. Magnesiumaluminiumsilikat, Stärken, wie Mais-, Weizen-, Reis- oder Pfeilwurzstärke, Gelatine, Traganth, Methylcellulose, Natriumcarboxymethylcellulose und/oder Polyvinylpyrrolidon, und, wenn erwünscht, Sprengmittel, z.B. Stärken, Agar, Alginsäure oder ein Salz davon, z.B. Natriumalginat, und/oder Brausemischungen, oder Absorptionsmittel, Farbstoffe, Geschmacksstoffe und Süßmittel aufweisen. Ferner kann man die neuen Verbindungen der Formel I in Form von parenteral verabreichbaren Präparaten oder von Infusionslösungen verwenden. Solche Lösungen sind vorzugsweise isotonische wässrige Lösungen oder Suspensionen, wobei diese z.B. bei lyophilisierten Präparaten, welche die Wirksubstanz allein oder zusammen mit einem Trägermaterial, z.B. Mannit, enthalten, vor Gebrauch hergestellt werden können. Die pharmazeutischen Präparate können sterilisiert sein und/oder Hilfsstoffe, z.B. Konservierungs-, Stabilisier-, Netz- und/oder Emulgiermittel, Löslichkeitsvermittler, Salze zur Regulierung des osmotischen Druckes und/oder Puffer enthalten. Die vorliegenden pharmazeutischen Präparate, die, wenn erwünscht, weitere pharmakologisch wirksame Stoffe enthalten können, werden in an sich bekannter Weise, z.B. mittels konventioneller Misch-, Granulier-, Dragier-, Lösungs- oder Lyophilisierungsverfahren hergestellt und enthalten von etwa 0,1% bis 100%, insbesondere von etwa 1% bis etwa 50%, Lyophilisate bis etwa 100% des Aktivstoffes.


Die Erfindung betrifft ebenfalls die Verwendung der Verbindungen der Formel I, vorzugsweise in Form von pharmazeutischen Präparaten. Die Dosierung kann von verschiedenen Faktoren, wie Applikationsweise, Spezies, Alter und/oder individuellem Zustand abhängen. Die täglich zu verabreichenden Dosen liegen bei oraler Applikation zwischen etwa 0,25 und etwa 10 mg/kg und für Warmblüter mit einem Körpergewicht von etwa 70 kg vorzugsweise zwischen etwa 20 mg und etwa 500 mg.

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Illustration der Erfindung; Temperaturen sind in Celsiusgraden, Drucke in mbar angegeben.

Beispiel 1: (2R,4S) und (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamin-hydrochlorid

Zu einem Gemisch von 3.65 g (11.4 mMol) (2R,4RS)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin in 30 ml Methanol, 935 mg (11.4 mMol) Natriumacetat, 0.65 ml (11.4 mMol) Essigsäure und 1.44 g (12 mMol) Phenylacetaldehyd werden unter Stickstoff bei 0° während 10 Minuten 1.26 g (17.1 mMol)

Natriumcyanoborhydrid (85%) portionsweise zugegeben. Danach rührt man das Reaktionsgemisch 3 Stunden bei Raumtemperatur, gibt nochmals 0.376 g (2.4 mMol) Phenylacetaldehyd zu und rührt 16 Stunden bei 4° aus. Man entfernt das Methanol am Rotationsverdampfer und verteilt das rötliche Reaktionsgemisch zwischen Ether und 1n-Natriumbicarbonatlösung. Die organischen Phasen werden mit 5 Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Man erhält ein Gemisch der Hydrochloride der Titelverbindungen der Formeln



als gelbes Öl. Dieses wird mit dem Elutionsmittelgemisch Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak
20 (97.5:2.25:0.25) zur Trennung der Diastereomeren an Kieselgel chromatographiert, wobei man die Diaste-
reomeren als freie Basen rein erhält.

DC: Methylenchlorid/Methanol (98:2)

Diastereomer A (2R,4R): $R_f = 0.16$, Smp. 248-249 °C, $[\alpha]_D = -56.9^\circ$ ($c = 0.946$, Methanol),

MS: $M^+ = 426$ (freie Base).

25 Diastereomer B (2R,4S): $R_f = 0.06$, Smp. 270 °C (Zersetzung), $[\alpha]_D = +30.6^\circ$ ($c = 0.759$, Methanol), MS: $M^+ = 426$ (freie Base).

Die Ausgangsverbindungen dazu werden wie folgt hergestellt:

a) (R)-3-Benzylamino-4-phenylbuttersäureethylester

30 Eine Lösung von 42.2 g (0.203 Mol) (R)-3-Amino-4-phenylbuttersäureethylester erhältlich durch Ver-
esterung der bekannten (R)-3-Amino-4-phenylbuttersäure mit Ethanol, 11.6 ml (0.203 Mol) Eisessig, 33.3 g
(0.406 Mol) Natriumacetat und 20.9 ml (0.207 Mol) Benzaldehyd in 400 ml Methanol werden bei -5 bis 5 °
portionenweise mit total 19.1 g Natriumcyanoborhydrid (0.304 Mol) versetzt. Nach beendeter Zugabe lässt
35 man noch 1 Stunde bei Raumtemperatur ausreagieren. Die gelbe Suspension engt man am Rotationsver-
dampfer fast vollständig ein und verteilt den breiigen Rückstand zwischen Essigester und Wasser, welches
man mit Ammoniaklösung auf pH ca. 8 stellt. Die organischen Phasen wäscht man mit Wasser und Sole
neutral, trocknet sie über Magnesiumsulfat und engt zur Trockne ein wobei man ein gelbes Öl erhält.
Dieses wird an Kieselgel mit Methylchlorid/Methanol 99:1 chromatographiert, wobei man die Titelverbin-
40 dung der Formel als schwach gelbes Öl erhält. Durch Zugabe von Oxalsäure zu einer etherischen Lösung
der Titelverbindung erhält man das Oxalat.

Smp. 142-143 •

DC: Methylenchlorid/Methanol (95:5): $R_f = 0.63$

MS: $M^+ - 91 = 206$ (60%)

45 $[\alpha]_D = +3^\circ$ (c = 1, Ethanol) freie Base

$$[\alpha]_D = -0.8^\circ \text{ (c = 1, CHCl}_3\text{) Oxalat}$$

C ₂₁ H ₂₅ NO ₆ (Oxalat):	C ber.	65.11%,	gef.	65.12%
	H ber.	6.51%,	gef.	6.46%
	N ber.	3.62%	gef.	3.77%

b) (R)-N-Benzyl-N-[(1-ethoxycarbonylmethyl-2-phenyl)ethyl]carbamoyl-essigsäuremethylester

Zu einer im Eiswasserbad gekühlten Lösung von 115.8 g (0.389 Mol) (R)-3-Benzylamino-4-phenylbuttersäure-ethylester, 56.8 ml (0.408 Mol) Triethylamin und 366 mg Dimethylaminopyridin in 630 ml Toluol tropft man während 2 1/2 Stunden eine Lösung von 43.8 ml (0.408 Mol) Malonsäuremonomethylesterchlorid

in 480 ml Toluol, sodass die Temperatur innerhalb 0-5° bleibt. Die Suspension lässt man während 2 Stunden ausreagieren und giesst sie danach auf 500 ml Eiswasser. Die organische Phase wird abgetrennt, nacheinander mit 0.1N Salzsäurelösung, 1N Natriumbicarbonatlösung und Eiswasser gewaschen, danach über Natriumsulfat getrocknet und zur Trockne eingeeengt. Das anfallende gelbe Öl chromatographiert man an Kieselgel mit Essigester/Hexan (1:2), wobei man die Titelverbindung erhält.

DC: Essigester/Hexan (1:2), $R_f = 0.25$

MS: $M^+ = 397$ (3%)

$[\alpha]_D = + 19.5^\circ$ ($c = 1.3$, CHCl_3)

10 c) (6R)-1,6-Dibenzyl-2,4-dioxo-3-piperidincarbonsäuremethylester

Zu einer Lösung von 53.9g (0.135 Mol) (R)-N-Benzyl-N-[(1-ethoxycarbonylmethyl-2-phenyl)ethyl]-carbamoyl-essigsäuremethylester in 520 ml tert.-Butanol gibt man bei Raumtemperatur 15.2g (0.135 Mol) Kaliumtertiärbutanolat und lässt während 1 Stunde ausreagieren. Die hellgelbe Suspension versetzt man bei Raumtemperatur mit 1 Äquivalent (8.1 g) Eisessig und engt auf ca. 100 ml Totalvolumen ein. Das Konzentrat verdünnt man mit 300 ml Wasser und extrahiert 3 mal mit je 300 ml Essigester. Die organischen Phasen wäscht man hiernach mit Wasser und Sole, trocknet die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man die Titelverbindung als klares, gelbes Öl erhält, welches ohne weitere Reinigung weiterverwendet wird; DC: Essigester/Methanol (1:1); $R_f = 0.3$.

20 d) (6R)-1,6-Dibenzyl-2,4-piperidindion

Eine Lösung von 106.1g (0.301 Mol) (6R)-1,6-Dibenzyl-2,4-dioxo-3-piperidin-carbonsäuremethylester in 298 ml Toluol und 445 ml 10 %-iger (Vol/Vol) Essigsäure wird während 2 1/2 Stunden auf 80° erwärmt. Das Reaktionsgemisch kühlt man auf Raumtemperatur, neutralisiert durch Zugabe von 48 g festem Natriumcarbonat unter Eiswasserkühlung, trennt die Phasen und extrahiert die wässrige Phase nochmals mit 300 ml Essigester. Die vereinigten organischen Phasen wäscht man mit Wasser und mit gesättigter Kochsalzlösung, trocknet sie über Natriumsulfat und engt zur Trockne ein. Das anfallende Öl kristallisiert man aus Ether, wobei man die Titelverbindung erhält.

30 Smp. 97-97.5°

DC: Essigester/Hexan (2:1), $R_f = 0.31$

$[\alpha]_D = + 166.9^\circ$ ($c = 1$, CHCl_3)

MS: $M^+ = 293$ (2.4%)

35 e) (2R,4RS)-1,2-Dibenzyl-4-piperidinamin

(Variante e1)

40 e1a) (6R)-1,6-Dibenzyl-4-(methoxyimino)-2-piperidon

Eine Lösung von 10 g (0.034 Mol) (6R)-1,6-Dibenzyl-2,4-piperidindion in 68 ml Pyridin versetzt man mit 3.09 g (0.037 Mol) Methoxyamin-hydrochlorid und erhitzt während 1h auf 85°. Die klare gelbe Lösung giesst man auf eiskalte 1N-Salzsäurelösung (pH ca. 3) und extrahiert mit Toluol. Die organischen Extrakte wäscht man mit 1N-Salzsäurelösung, dann mit 1N-Sodalösung und mit Sole. Danach trocknet man über Natriumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man die Titelverbindung in Form wachsartiger Kristalle erhält.

Smp. 63-77°

DC: Essigester/Hexan (1:1), $R_f = 0.52$

MS: $M^+ = 322$ (1.4%)

50 Auf Grund des $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) liegt ein *syn/anti*-Gemisch im Verhältnis von ca. 7:3 vor, Methoxysignale des Oximethers bei 3.92 bzw. 3.88 ppm.

e1b) (2R,4RS)-1,2-Dibenzyl-4-piperidinamin

55 In einer Destillationsapparatur mit aufgesetzter Vigreuxkolonne und mit 40° warmem Wasser durchströmtem Kühler erhitzt man eine Lösung von 9.19 g (0.0285 Mol) (6R)-1,6-Dibenzyl-4-(methoxyimino)-2-piperidon in 90 ml Tetrahydrofuran unter Argon zum Rückfluss. Zu dieser Lösung tropft man innert 20 Minuten 6.1 ml (0.0643 Mol) Boran/Dimethylsulfidkomplex gefolgt von einer zweiten Zugabe von 9 ml

(0.0949 Mol) Boran/Dimethylsulfidkomplex innert 4 Stunden. Während der Zugabe des Boran/Dimethylsulfidkomplexes entweicht das frei werdende Dimethylsulfid durch die Destillationsapparatur.

Nach beendeter Zugabe kühlt man das Reaktionsgemisch im Eiswasserbad auf 0-4 ° und hydrolysiert überschüssiges Boran durch langsame Zugabe von total 20 ml Methanol. Nach Abklingen der heftigen, exothermen Hydrolyse entfernt man die Lösungsmittel am Wasserstrahlvacuum direkt aus der Apparatur. Danach kocht man den Rückstand während 2 Stunden nach Zugabe von 90 ml 5N-Salzsäurelösung. Die auf Raumtemperatur gekühlte Lösung verdünnt man mit 200 ml Wasser, extrahiert mit Ether zur Entfernung von Säure- und Neutralteil, kühlt danach die Wasserphase im Eiswasserbad, stellt sie mit 5N-Natronlauge auf pH ca. 9 und extrahiert den Baseteil mit Ether/Tetrahydrofuran (2:1). Die organischen Extrakte trocknet man über Magnesiumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man die Rohbase in Form eines gelblichen Öles erhält. Diese wird direkt in die nächste Stufe eingesetzt; DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (90:10:0.4), $R_f = 0.3$.

Durch Lösen in methanolischer Salzsäurelösung und Zugabe von Ether fällt man amorphes Dihydrochlorid der Titelverbindung; Smp. 150-182 °.

15 Variante e2)

e2a) (6R)-1,6-Dibenzyl-2,4-piperidindion-4-ethylenketal

20 Eine Lösung von 30 g (0.102Mol) (6R)-1,6-Dibenzyl-2,4-piperidindion, 50 ml Ethylenglykol und 1.8 g p-Toluolsulfonsäure-monohydrat in 800 ml Toluol erhitzt man während 3h am Wasserabscheider. Die auf Raumtemperatur gekühlte Lösung wäscht man mit 100 ml 1N-Natriumbicarbonatlösung und Sole, trocknet die organische Phase über Magnesiumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man das rohe Ketal als Öl erhält. Dieses chromatographiert man an Kieselgel mit Essigester und kristallisiert das aus der Chromatographie erhaltene Öl aus Ether, wobei man die Titelverbindung in Form weisser Kristalle erhält.

25 Smp. 91-93 °

DC: Essigester/Hexan (3:1), $R_f = 0.53$

MS: M^+ : 337

30 e2b) (2R)-1,2-Dibenzyl-4-piperidon-ethylenketal

Eine Lösung von 10.2 g (0.0302Mol) (6R)-1,6-Dibenzyl-2,4-piperidindion-4-ethylenketal in 100 ml Tetrahydrofuran versetzt man unter Argon innert 10 Minuten mit 7.6 ml (0.0756 Mol) Boran/Dimethylsulfidkomplex und erhitzt für 1h zum Rückfluss. Danach gibt man zur auf Raumtemperatur gekühlten Lösung 40 ml 2N-Natronlauge und erhitzt erneut während 2h zum Rückfluss, entfernt anschließend das Tetrahydrofuran am Rotationsverdampfer und extrahiert das Reaktionsgemisch mit Ether. Die organischen Extrakte wäscht man mit Natriumbicarbonat, trocknet sie über Magnesiumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man die Titelverbindung erhält; DC: Essigester/Hexan (2:1), $R_f = 0.81$; MS: M^+ : 323.

40 e2c) (2R)-1,2-Dibenzyl-4-piperidon

Eine Lösung von 85.7 g (0.261 Mol) (2R)-1,2-Dibenzyl-4-piperidon-ethylenketal in 170 ml Dioxan und 1000 ml 2.25 M Salzsäurelösung werden während 29 Stunden auf 70 ° erwärmt. Danach entfernt man das Dioxan im Vacuum, stellt die Wasserphase mit 30 %-iger Natronlauge unter Eiswasserkühlung auf pH ca. 8 und extrahiert mit Ether. Die Etherextrakte wäscht man mit 1N-Natriumbicarbonatlösung, trocknet sie über Natriumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man die Titelverbindung als rötliches Öl erhält, das wegen seiner Instabilität ohne weitere Reinigung weiterverarbeitet wird; DC: Essigester/Hexan (1:1); $R_f = 0.71$; FD-MS: M^+ : 279

50 e2d) (2R)-1,2-Dibenzyl-4-(methoxyimino)-piperidin

3 g (0.01071 Mol) (2R)-1,2-Dibenzyl-4-piperidon, 4.4 g (0.0537 Mol) Natriumacetat und 942 mg (0.0113 Mol) Methoxyamin-hydrochlorid löst man in 30 ml Ethanol und erhitzt die 30 Minuten auf 60 °. Danach entfernt man das Ethanol im Vacuum und verteilt den Rückstand zwischen Wasser und Essigester, trocknet die organischen Extrakte über Natriumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man das Rohprodukt erhält. Dieses chromatographiert man an Kieselgel mit Essigester/Hexan (3:1), wobei man die Titelverbindung in Form eines Öles erhält.

DC: Essigester/Hexan (1:1), $R_{f1} = 0.84$, $R_{f2} = 0.76$ (syn-/anti-Oximether)

MS: M^+ : 308 (1%), $M^+ - 91$: 217 (90%).

$^1\text{H-NMR}$ -Spektrum (CD_3OD), $\delta(\text{ppm}) = 3.85$ (s, = N-OCH_3), 3.825 (s): ca. 1:1

e2e) (2R,4RS)-1,2-Dibenzyl-4-piperidinamin

5

In eine Lösung von 5.43 g (17.6 mMol) (2R)-1,2-Dibenzyl-4(methoxyimino)-piperidin in 60 ml Tetrahydrofuran kondensiert man bei -78° 180 ml über Kaliumhydroxid getrocknetes Ammoniakgas. Zu dieser Lösung gibt man bei -70° 3.7 g (69 mMol) Ammoniumchlorid und portionenweise 1.6 g (70.4 mMol) Natrium-Metall. Nach einer Stunde gibt man zur entstandenen Suspension nochmals 3.7 g Ammoniumchlorid und 0.6 g

10

Natrium-Metall und rührt 2 Stunden bei -70° nach. Danach entfernt man das Kühlbad und lässt das Ammoniakgas verdampfen. Den Rückstand verteilt man zwischen 1N-Natronlauge und Ether, trennt die organische Phase ab, extrahiert die wässrige Phase nach, wäscht die organischen Phasen mit Sole, trocknet die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat und engt zur Trockne ein, wobei man die Titelverbindung in Form eines gelben

15

Öles erhält; DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (90:9:1), $R_f = 0.33$; MS: $M^+ = 280$

f) (2R,4RS)-N-(1,2-Dibenzyl-4-piperidyl)-trifluoracetamid-trifluoracetat

20

Eine Lösung von 6.88 g (24.5 mMol) (2R,4RS)-1,2-Dibenzyl-4-piperidinamin in 20 ml Methylenchlorid wird im Eiswasserbad mit 5.1 ml (36.8 mMol) Trifluoressigsäure-anhydrid versetzt und danach bei Raumtemperatur während einer Stunde ausgerührt. Das Reaktionsgemisch wird zur Trockne eingeeengt, wobei man die Titelverbindung als schwach gelben Schaum erhält; DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (190:9:1), $R_f = 0.41$ (cis) bzw. 0.57 (trans) Diastereomeres; MS: $M^+ - 91$ (Benzyl) = 285 (14%).

25

g) (2R,4RS)-N-(2-Benzyl-4-piperidyl)-trifluoracetamid-trifluoracetat

30

Zu einer Lösung von 19.3 g (39.4 mMol) (2R,4RS)-N-(1,2-Dibenzyl-4-piperidyl)-trifluoracetamid-trifluoracetat in 160 ml Dioxan gibt man unter Stickstoff 3.0 g 10% Palladiumkatalysator auf Kohle und hydriert bei Raumtemperatur unter Normaldruck. Das Reaktionsgemisch wird über Celite® vom Katalysator befreit und den Rückstand wäscht man mit Dioxan nach. Das Filtrat wird zur Trockne eingeeengt und am Hochvacuum getrocknet, wobei man die Titelverbindung erhält, die ohne weitere Reinigung weiterverwendet wird; DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (90:9:1) $R_f = 0.24$ bzw. 0.3 (zwei schwach getrennte Diastereomere)

35

h) (2R,4RS)-N-[2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidyl]-trifluoracetamid

40

Zu einem mit Eiswasser gekühlten Gemisch von 1.39 g (3.44 mMol) (2R,4RS)-N-(2-Benzyl-4-piperidyl)-trifluoracetamid-trifluoracetat und 10 ml Toluol/Wasser (1:1) gibt man unter Rühren 710 mg festes Natriumbicarbonat und 712 mg 3,5-Dimethylbenzoylchlorid. Danach lässt man das Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur erwärmen, rührt 2 Stunden nach und verteilt zwischen Toluol und 1N-Natriumbicarbonatlösung. Die organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingeeengt. Das farblose Öl wird mit Essigester/Hexan 1:2 an Kieselgel chromatographiert, wobei man die Titelverbindung erhält. Diese wird ohne weitere Reinigung weiterverwendet.

45

DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (190:9:1) $R_f = 0.5$, (keine Trennung der beiden Diastereomere unter diesen Bedingungen)
MS: $M^+ = 418$ (3%), $M^+ - 91$ (43%)

i) (2R,4RS)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin

50

Eine Lösung von 4.73 g (10.4 mMol) (2R,4RS)-N-[2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidyl]-trifluoracetamid in 50 ml Tetrahydrofuran/Methanol 1:1 wird bei Raumtemperatur unter Stickstoff mit 4.1 ml 5N-Natriumhydroxidlösung versetzt und 3 Stunden zum Rückfluss erhitzt. Nach beendeter Reaktion kühlt man das Reaktionsgemisch in Eiswasser, stellt mit 1N-Salzsäurelösung auf pH ca. 1 und entfernt die organischen Lösungsmittel am Rotationsverdampfer. Die verbleibende saure Wasserphase extrahiert man zuerst mit Ether zur Entfernung von Säure- und Neutralteil, stellt sie danach unter Eiswasserkühlung durch Zugabe von 10N Natriumhydroxidlösung auf pH ca. 10 und extrahiert mit Ether. Die organischen Phasen wäscht man mit Sole, trocknet sie über Natriumsulfat und dampft zur Trockne ein, wobei man die freie Base als bräunliches Öl erhält, das ohne weitere Reinigung weiterverwendet wird; DC: Methylenchlorid


55

rid/Methanol/conc. Ammoniak (90:9:1) $R_f = 0.29$; MS: $M^+ = 322$ (0.03%), $M^+ - 91 = 231$ (62%).

Analog dazu erhält man ausgehend von L-Phenylalaninol gemäss der vorstehenden Reaktionssequenz (2S,4RS)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin.

5 Beispiel 2: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Zur Lösung von 106 mg (0.182 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin in 1.5 ml Methanol werden bei 0° während 20 Minuten 28 mg (0.73 mMol) Natriumborhydrid in drei Portionen gegeben und das Gemisch anschliessend 3 Stunden bei 0° gerührt.
 10 Danach versetzt man das Reaktionsgemisch mit 0.06 ml (0.81 mMol) Aceton und rührt 10 Minuten aus. Man entfernt das Methanol am Rotationsverdampfer und verteilt den festen weissen Rückstand zwischen Ethylacetat und Wasser. Die organischen Phasen werden mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Der erhaltene weisse Schaum wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1500:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Es wird die Titelverbindung der
 15 Formel



30 als weisser Schaum erhalten. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.34$, FD-MS: $M^+ = 485$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

35 a) 2-Benzyl-N-benzyloxycarbonyl-2,3-dihydro-4-(1H)-pyridon

Zur Lösung von 104 g (0.95 Mol) 4-Methoxypyridin in 1 l wasserfreiem Tetrahydrofuran wird bei -70° unter Argon 165 ml (1.16 Mol) Chlorameisensäurebenzylester innert 20 Minuten zugetropft. Danach verdünnt man die dicke beige Suspension mit 200 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran. Nun lässt man das Grignardreagens, hergestellt in 160 ml wasserfreiem Ether aus 35.5 g (1.46 Mol) Magnesiumspänen und
 40 460 ml (1.46 Mol) einer 3 molaren Lösung von Benzylchlorid in wasserfreiem Ether, während 75 Minuten zum Reaktionsgemisch zutropfen und behält die Temperatur bei -70°. Nach weiteren 10 Minuten lässt man auf Raumtemperatur erwärmen. Man verdünnt mit 500 ml Ether, tropft 900 ml 4 N Salzsäure dazu und trennt die Phasen. Die organischen Phasen werden mit Wasser und Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wird mit Hexan/Ethylacetat (3:1) an Kieselgel
 45 chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als farbloses zähflüssiges Öl. DC: Hexan/Ethylacetat (1:3) $R_f = 0.7$, IR: 1725, 1665, 1602 cm^{-1} .

b) (2R*,4R*)-2-Benzyl-4-hydroxy-piperidin

50 Man hydriert 150 g (0.467 Mol) 2-Benzyl-N-benzyloxycarbonyl-2,3-dihydro-4-(1H)-pyridon in 1.5 l Methanol mit 7.5 g Pd/C (10 %-ig) als Katalysator, fügt danach 50 g Raney-Nickel und weitere 200 ml Methanol dazu und lässt aushydrieren. Nach Filtration wird am Rotationsverdampfer eingeeengt und das bräunliche Öl mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (60:10:1) an Kieselgel chromatographiert.

Man erhält die Titelverbindung als halbkristalline Masse, welche ohne zusätzliche Reinigung weiter
 55 verwendet wird. Die Kristallisation einer Probe aus Ether/Hexan ergab weisse Kristalle vom Smp. 111-112°. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (40:10:1) $R_f = 0.55$, FD-MS: $M^+ = 191$.

c) (2R*,4R*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-4-hydroxy-piperidin

Man lässt die Lösung von 28 g (146 mMol) (2R*,4R*)-2-Benzyl-4-hydroxy-piperidin und 35.1 g (161 mMol) Di-tert.-butyl-dicarbonat in 500 ml Chloroform bei 50 ° während 20 Stunden rühren. Danach wird am Rotationsverdampfer eingeeengt und das gelbe Öl an Kieselgel mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) chromatographiert. Die Titelverbindung wird als gelbes Öl erhalten. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.43$, FD-MS: $M^+ = 291$.

d) (2R*,4R*)-2-Benzyl-1-t-Butyloxycarbonyl-4-methansulfonyloxy-piperidin

Zur Lösung von 62.4 g (214 mMol) (2R*,4R*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidin in 75 ml Pyridin tropft man unter Eiskühlung 33.3 ml (428 mMol) Methansulfonsäurechlorid. Nach 30 Minuten bei 0 ° lässt man die Suspension 3 Stunden bei Raumtemperatur ausrühren. Nach Einengen am Rotationsverdampfer wird das Reaktionsgemisch in Ethylacetat aufgenommen, mit Wasser und Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und am Rotationsverdampfer eingedampft. Aus Ether kristallisiert die Titelverbindung in weissen Kristallen; Smp. 110 - 115 °; DC: Toluol/Ethylacetat (4:1) $R_f = 0.42$, FD-MS: $M^+ = 369$.

e) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-piperidin-4-azid

Man lässt das Gemisch aus 98.9 g (267 mMol) (2R*,4R*)-2-Benzyl-1-t-Butyloxycarbonyl-4-methansulfonyloxy-piperidin, 14.4 g (294 mMol) Lithiumazid und 500 ml N,N-Dimethylformamid 3 Stunden bei 80 ° unter Argon rühren. Das Reaktionsgemisch wird mit Ethylacetat verdünnt und mit Wasser und Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das bräunliche Öl wird mit Toluol/Ethylacetat (9:1) als Elutionsmittel an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung im Gemisch mit 2-Benzyl-N-t-butyloxycarbonyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin (Gewichtsverhältnis = 4,2:1 gemäss $^1\text{H-NMR}$), welches nicht weiter aufgetrennt wird. DC: Toluol/Ethylacetat (9:1) $R_f = 0.59$, FD-MS: $M^+ = 316$, IR: 2100, 1685 cm^{-1} .

f) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-4-piperidinamin

Das Gemisch aus 4.16 g (13.1 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-4-piperidinazid und 0.99 g (3.62 mMol) 2-Benzyl-N-t-butyloxycarbonyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin (berechnet aufgrund des $^1\text{H-NMR}$ -Spektrums) wird in 100 ml Methanol mit Wasserstoff und 1 g 10 %-iger Pd/C hydriert. Nach beendeter Wasserstoffaufnahme wird abfiltriert und am Rotationsverdampfer eingeeengt. Das braune Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.4$, FD-MS: $M^+ = 290$.

g) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Das Gemisch von 5 g (17.2 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-4-piperidinamin und 2.7 g (17.2 mMol) Chinolin-4-carboxaldehyd wird in 50 ml Toluol bei Raumtemperatur gerührt und nach 2 Stunden mit 2.8 g (23.3 mMol) wasserfreiem Magnesiumsulfat versetzt. Nach weiteren 16 Stunden wird filtriert und das Filtrat eingeeengt. Das braune Öl löst man in 50 ml Methanol und versetzt mit 0.69 g (18.3 mMol) Natriumborhydrid in 4 Portionen. Nach 3 Stunden Rühren bei Raumtemperatur wird das Reaktionsgemisch eingeeengt, in Ethylacetat aufgenommen und mit Wasser und Sole gewaschen. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das braune Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (850:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.38$, FD-MS: $M^+ = 431$.

h) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Die Lösung von 6.2 g (14.4 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin und 2.6 ml (18.7 mMol) Triethylamin in 60 ml Methylenchlorid wird bei 0 ° unter Argon mit 2.2 ml (15.8 mMol) Trifluoressigsäureanhydrid versetzt und das Reaktionsgemisch 3 Stunden bei 0 ° gerührt. Man verdünnt mit Methylenchlorid und wäscht mit Wasser. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Man erhält die Titelverbindung als DC-reines Produkt als

gelbes Öl. DC:

Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.62$, DCI-MS: $(M + H)^+ = 528$.

i) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin


Unter Eiskühlung wird zu 7.73 g (14.7 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin 250 ml 6 N Chlorwasserstoff in Dioxan während 3 Minuten getropft und das Gemisch anschliessend 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wird am Rotationsverdampfer eingeeengt, mit 1 N Natriumhydrogencarbonatlösung basisch gestellt und mit Methylenchlorid extrahiert. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das bräunliche Öl (7.14 g) wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc.-Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.42$, DCI-MS: $(M + H)^+ = 428$, IR: 1690 cm^{-1} .

j) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Zur Lösung von 97 mg (0.56 mMol) 2-Naphthoesäure in 1 ml Toluol wird während 10 Minuten unter Argon bei 50° die Lösung von 58 µl (0.795 mMol) Thionylchlorid in 0.2 ml Toluol zugetropft und das Reaktionsgemisch 2 Stunden bei 80° gerührt. Danach wird am Rotationsverdampfer eingeeengt, zweimal mit je 1 ml Toluol versetzt und wieder eingeeengt. Man löst das braune Öl in 1 ml Methylenchlorid, gibt es unter Argon bei 0° zu einer Lösung von 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und rührt 2 Stunden bei 0°. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch mit Wasser versetzt und mit Methylenchlorid extrahiert. Die organischen Phasen werden mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das gelbe Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.36$, FD-MS: $M^+ = 581$.

Beispiel 3: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-trifluormethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 0.184g (0.307 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-trifluormethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.046 g (1.23 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung der Formel



als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.28$, FD-MS: $M^+ = 503$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:


(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-trifluormethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2j werden 106 mg (0.56 mMol) 3-Trifluormethylbenzoesäure zuerst mit 58 µl (0.795 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.56$, FD-MS: $M^+ = 599$.

Beispiel 4: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 0.271 g (0.406 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.061 g (1.23 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt.

5 Man erhält die Titelverbindung



20 als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.21$, FD-MS: $M^+ = 571$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

25

Zur Lösung von 200 mg (467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 113 mg (561 mMol) 3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzoesäure in 3 ml Methylenchlorid gibt man 143 mg (561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 μ l (1.03 mMol) Triethylamin und lässt das Reaktionsgemisch 16 Stunden bei Raumtemperatur rühren. Danach wird mit Methylenchlorid

30 verdünnt, und die organische Phase je einmal mit 10 %-iger Citronensäure, 1N-Natriumhydrogencarbonatlösung und mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Der gelbliche Schaum wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.34$, FD-MS: $M^+ = 667$.

35


Beispiel 5: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 250 mg (0.423 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 64 mg (1.69 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man

40 erhält die Titelverbindung

45

50



55 als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.23$, DCI-MS: $(M + H)^+ = 496$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 102 mg (0.561 mMol) 3,5-Dimethoxybenzoesäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 μ l (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.31, FD-MS: M^+ = 591.

Beispiel 6: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(1-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 200 mg (0.344 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(1-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 52 mg (1.37 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.35, FD-MS: M^+ = 485.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(1-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Zur Lösung von 96 mg (0.561 mMol) 1-Naphthoesäure in 2 ml trockenem Methylenchlorid gibt man bei 0° 92 μ l (0.655 mMol) 1-Chlor-N,N,2-trimethyl-1-propen-1-amin und rührt das Gemisch 1 Stunde bei 0° und eine Stunde bei Raumtemperatur. Zu dieser gelben Lösung wird anschliessend die Lösung von 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 130 μ l (0.936 mMol) Triethylamin in 3 ml Methylenchlorid innert 10 Minuten bei Raumtemperatur getropft. Nach 3 Stunden Rühren bei Raumtemperatur wird mit Wasser versetzt, die organische Phase abgetrennt und noch zweimal mit Wasser gewaschen. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das gelbe Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (800:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.49, FD-MS: M^+ = 581.

Beispiel 7: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 1.21 g (2.01 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.305 mg (8.06 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum; DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.37$; FD-MS: $M^+ = 503$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2j werden 1.11 g (5.85 mMol) 3,5-Dichlorbenzoesäure zuerst mit 0.63 ml (8.77 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 1 g (2.34 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.65$, FD-MS: $M^+ = 599$.

Beispiel 8: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chinolylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 155 mg (0.266 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chinolylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 40 mg (1.06 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.42$, FD-MS: $M^+ = 486$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chinolylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2j werden 97 mg (0.56 mMol) Chinolin-2-carbonsäure zuerst mit 58 μ l (0.795 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.45$, FD-MS: $M^+ = 582$.

Beispiel 9: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlor-phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 256 mg (0.441 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlor-phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 66 mg (1.76 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.48$, FD-MS: $M^+ = 484$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlor-phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2j werden 96 mg (0.56 mMol) 4-Chlor-phenylessigsäure zuerst mit 58 μ l (0.795 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.39$, FD-MS: $M^+ = 580$.

Beispiel 10: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 80 mg (0.142 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 22 mg (0.57 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als farbloses Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.43$, FD-MS: $M^+ = 465$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:


(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Zur Lösung von 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin in 4 ml Methylenchlorid gibt man bei 0 °C 67 μ l (0.468 mMol) Chlorameisensäurebenzylester und 72 μ l (0.515 mMol) Triethylamin und lässt das Gemisch bei dieser Temperatur 16 Stunden rühren. Danach werden nochmals 34 μ l (0.234 mMol) Chlorameisensäurebenzylester und 36 μ l (0.257 mMol) Triethylamin zugefügt und 3 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird mit Methylenchlorid verdünnt und die organische Phase mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.61$, FD-MS: $M^+ = 561$.

Beispiel 11: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 215 mg (0.494 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 77 mg (1.97 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die

5 Titelverbindung



20 als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.34$, FD-MS: $M^+ = 435$.
Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin


25 209 μ l (0.936 mMol) Phenylacetaldehyd tropft man innert 10 Minuten bei Raumtemperatur zu einer Lösung von 100 mg (0.233 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin, 58 mg (0.702 mMol) Natriumacetat, 44 mg (0.702 mMol) Natriumcyanoborhydrid und 67 μ l (1.17 mMol) Essigsäure in 2 ml Ethanol. Man lässt das Reaktionsgemisch 16 Stunden bei Raumtemperatur rühren. Nach Eindampfen am Rotationsverdampfer wird der Rückstand in Ethylacetat aufgenommen, die organische

30 Phase mit Wasser und mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das gelbe Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.33$, FD-MS: $M^+ = 531$.

35 Beispiel 12: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 160 mg (0.269 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 42 mg (1.13 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die

40 Titelverbindung



als farbloses Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.27$, FD-MS: $M^+ = 499$.


55 Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 6 werden 105 mg (0.561 mMol) 2-Naphthylessigsäure zuerst mit 92 μ l (0.655 mMol) 1-Chlor-N,N,2-trimethyl-1-propen-1-amin und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 130 μ l (0.936 mMol) Triethylamin zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.56, FD-MS: M^+ = 595.

Beispiel 13: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chinolylmethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 128 mg (0.225 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chinolylmethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 34 mg (0.872 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung




als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.45, FD-MS: M^+ = 490.
Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chinolylmethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 11 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 88 mg (1.4 mMol) Natriumcyanoborhydrid, 115 mg (1.4 mMol) Natriumacetat, 134 μ l (2.34 mMol) Essigsäure und 294 mg (1.87 mMol) Chinolin-4-carboxaldehyd zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.33, FD-MS: M^+ = 568.

Beispiel 14: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorbenzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 128 mg (0.218 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorbenzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 34 mg (0.920 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.25, FD-MS: M^+ = 472.
Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

a) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chinolylmethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 11 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 88 mg (1.4 mMol) Natriumcyanoborhydrid, 115 mg (1.4 mMol) Natriumacetat, 134 μ l (2.34 mMol) Essigsäure und 294 mg (1.87 mMol) Chinolin-4-carboxaldehyd zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.33, FD-MS: M^+ = 568.


Beispiel 15: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,2-diphenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

10 Analog Beispiel 2 werden 170 mg (0.280 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,2-diphenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 42 mg (1.12 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

15

20

25



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.28, FD-MS: M^+ = 511.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

30

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,2-diphenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 11 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 88 mg (1.4 mMol) Natriumcyanoborhydrid, 115 mg (1.4 mMol) Natriumacetat, 134 μ l (2.34 mMol) Essigsäure und 335 μ l (1.87 mMol) Diphenylacetaldehyd zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) R_f = 0.50, FD-MS: M^+ = 607.


Beispiel 16: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylcarbamoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

40 Analog Beispiel 2 werden 210 mg (0.384 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylcarbamoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 58 mg (1.54 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

45

50

55



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.33, FD-MS: M^+ = 450.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylcarbamoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Zur Lösung von 72 mg (0.608 mMol) Phenylisocyanat in 5 ml Toluol gibt man die Lösung von 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und rührt das Reaktionsgemisch 2 Stunden bei 100°. Die weisse Suspension wird abgekühlt und filtriert. Man erhält die Titelverbindung als weisse Kristalle vom Schmelzpunkt 245° (Zersetzung). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.76$, FD-MS: $M^+ = 546$.

Beispiel 17: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(diphenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 235 mg (0.378 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(diphenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 58 mg (1.51 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.49$, FD-MS: $M^+ = 525$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(diphenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2j werden 248 mg (1.17 mMol) Diphenylelessigsäure zuerst mit 128 μ l (1.76 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.45$, FD-MS: $M^+ = 621$.

Beispiel 18: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 180 mg (0.329 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 50 mg (1.32 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.28$, FD-MS: $M^+ = 450$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

5 (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 98 mg (0.561 mMol) 2-Pyridyllessigsäure-hydrochlorid, 143 mg (0.562 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 209 μ l (1.50 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die
10 Titelverbindung als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.60$, FD-MS: $M^+ = 546$.


Beispiel 19: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

15 Analog Beispiel 2 werden 200 mg (0.366 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 55 mg (1.46 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

20

25

30



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.31$, FD-MS: $M^+ = 450$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

35

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 98 mg (0.561 mMol) 4-Pyridyllessigsäure-hydrochlorid, 143 mg (0.562 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 209 μ l (1.50 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die
40 Titelverbindung als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.56$, FD-MS: $M^+ = 546$.


Beispiel 20: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,3-diphenylpropionyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

45

Analog Beispiel 2 werden 340 mg (0.535 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,3-diphenylpropionyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 81 mg (2.14 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

50

55



als

Diastereomerengemisch in Form von weissem Schaum. DC:

Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.37$, FD-MS: $M^+ = 539$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:


(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,3-diphenylpropionyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 300 mg (0.702 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 190 mg (0.842 mMol) (R,S)-2,3-Diphenylpropionsäure, 214 mg (0.842 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 216 μ l (1.54 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum. DC:

Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.74$, FD-MS: $M^+ = 635$.

Beispiel 21: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 197 mg (0.315 mMol) des Diastereomerengemisches (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 48 mg (1.26 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als Diastereomerengemisch in Form von weissem Schaum. DC:

Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.50$, FD-MS: $M^+ = 529$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Zur Lösung von 338 mg (0.399 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((3S)-(2-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin in 3 ml N,N-Dimethylformamid gibt man 1.97 ml (19.9 mMol) Piperidin und rührt das Gemisch 2 Stunden bei Raumtemperatur. Dann wird am Rotationsverdampfer eingeeengt und der Rückstand zur Trennung der Diastereomeren mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) an Kieselgel chromatographiert.

DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1)

Diastereomer A : $R_f = 0.21$, FD-MS: $M^+ = 625$,

Diastereomer B : $R_f = 0.13$, FD-MS: $M^+ = 625$.


5 Beispiel 22: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 230 mg (0.409 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 81 mg (2.14 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung der Formel

10

15

20



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.26$, FD-MS: $M^+ = 465$.

25 Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 85 mg (0.561 mMol) 3-Methoxybenzoesäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 μ l (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.45$, FD-MS: $M^+ = 561$.


35 Beispiel 23: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-N,N-dimethylaminobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 225 mg (0.391 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-N,N-dimethylaminobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 59 mg (1.56 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

40

45

50



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.36$, FD-MS: $M^+ = 478$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-N,N-dimethylaminobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 93 mg (0.561 mMol) 3-N,N-Dimethylaminobenzoessäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 µl (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.65, FD-MS: M⁺ = 574.

Beispiel 24: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(cis,cis-3,5-dimethylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 195 mg (0.345 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(cis,cis-3,5-dimethylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 52 mg (1.38 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.24, FD-MS: M⁺ = 469.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(cis,cis-3,5-dimethylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 87 mg (0.561 mMol) cis,cis-3,5-Dimethylcyclohexylcarbonsäure (hergestellt nach der Methode von H. van Bekkum et. al., Koninkl. Ned. Akad. Wetenschap, Proc. Ser. B. 64, 161 (1961), 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 µl (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.32, FD-MS: M⁺ = 565.

Beispiel 25: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 280 mg (28 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 65 mg (1.71 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.35$, FD-MS: $M^+ = 557$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Man rührt das Gemisch aus 129 μ l (0.702 mMol) 3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzylbromid, 194 mg (1.40 mMol) Kaliumcarbonat und 300 mg (0.702 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin in 3 ml N,N-Dimethylformamid während 17 Stunden bei 60°. Darauf wird die Suspension abfiltriert, mit Aceton gut nachgewaschen und das Filtrat am Rotationsverdampfer eingengt. Den Rückstand nimmt man in Methylenchlorid auf und wäscht nacheinander mit 10% wässriger Zitronensäure, 1 N Natriumhydrogencarbonatlösung, Wasser und Sole und trocknet über Magnesiumsulfat. Das gelbe Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (3000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (3000:50:1) $R_f = 0.36$, FD-MS: $M^+ = 653$.

Beispiel 26: (2S*,4R*)-2-Benzyl-1-[2-(5-chlor-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenoxyethyl]-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 100 mg (0.54 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 23 mg (0.62 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.23$, FD-MS: $M^+ = 553$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:


(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-[2-(5-chlor-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenoxyethyl]-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 24 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 141 mg (0.468 mMol) 2-(5-chlor-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenoxy)ethylbromid und 129 mg (0.936 mMol) Kaliumcarbonat umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum. DC:

Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.23$, FD-MS: $M^+ = 649$.

Beispiel 27: Diastereomer A von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

5 Analog Beispiel 2 werden 112 mg (0.195 mMol) des Diastereomeren A von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 30 mg (0.801 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.21$, FD-MS: $M^+ = 478$.

Die Ausgangsverbindungen dazu werden wie folgt hergestellt:

25 a) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-tert.-butyloxycarbonyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4 werden 300 mg (0.702 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 223 mg (0.842 mMol) (S)-N-tert.-Butyloxycarbonyl-phenylalanin, 214 mg (0.842 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 215 μ l (1.54 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als Diastereomeregemisch in Form eines gelben Öls. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.37$, FD-MS: $M^+ = 674$.

35 b) Diastereomere von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Zu 920 mg (1.36 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-tert.-butyloxycarbonyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin gibt man 3.1 ml (4.09 mMol) Trifluoressigsäure und rührt das Reaktionsgemisch 2 Stunden bei Raumtemperatur. Dann wird am Rotationsverdampfer eingeeengt, der Rückstand in Wasser aufgenommen, bei 0 °C mit 1 N Natriumhydrogencarbonatlösung basisch gestellt und mit Methylenchlorid extrahiert. Die organischen Phasen werden mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wird zur Trennung der Diastereomeren mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2500:50:1) an Kieselgel chromatographiert. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1)

Diastereomer A: $R_f = 0.24$, FD-MS: $M^+ = 574$,


Diastereomer B: $R_f = 0.22$, FD-MS: $M^+ = 574$.

Die Mischfraktionen von Diastereomer A und B wurden nicht weiter aufgetrennt.

50 Beispiel 28: Diastereomer B von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 115 mg (0.200 mMol) des Diastereomeren B von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 30 mg (0.801 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

55




als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.20$, FD-MS: $M^+ = 478$.

Zur Ausgangsverbindung dazu siehe Beispiel 27a.

Beispiel 29: Diastereomer A von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 174 mg (0.303 mMol) des Diastereomeren A von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 46 mg (1.211 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.28$, FD-MS: $M^+ = 478$.

Die Ausgangsverbindungen dazu werden wie folgt hergestellt:

Diastereomere von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 27b werden 1.10 g (1.63 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-tert.-butoxycarbonyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 3.8 ml (48.8 mMol) Trifluoressigsäure behandelt. Man erhält die Diastereomeren der Titelverbindung. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1)


Diastereomer A: $R_f = 0.52$, FD-MS: $M^+ = 574$,

Diastereomer B: $R_f = 0.50$, FD-MS: $M^+ = 574$.

Die Mischfraktionen von Diastereomer A und B wurden nicht weiter aufgetrennt.

Beispiel 30: Diastereomer B von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 92 mg (0.160 mMol) des Diastereomeren B von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 25 mg (0.640 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung




als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.49$, FD-MS: $M^+ = 478$.

Zur Ausgangsverbindung dazu siehe Beispiel 27a.

Beispiel 31: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

20 Analog Beispiel 2 werden 160 mg (0.259 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 39 mg (1.04 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als Diastereomerengemisch als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.22$, FD-MS: $M^+ = 520$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

45 Zur Lösung von 180 mg (0.313 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin in 2 ml Pyridin werden bei 0° 35 μ l (0.376 mMol) Essigsäureanhydrid zugefügt und das Gemisch 2.5 Stunden bei 0° gerührt. Nach Einengen am Rotationsverdampfer wird der ölige Rückstand in Methylenchlorid aufgenommen, mit 5% wässriger Zitronensäure und mit 1 N Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.39$, FD-MS: $M^+ = 616$.

Beispiel 32: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

55 Analog Beispiel 2 werden 185 mg (0.411 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 62 mg (1.64 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als Diastereomerengemisch (weisser Schaum). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1)
 $R_f = 0.42$, FD-MS: $M^+ = 520$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 31 werden 200 mg (0.348 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 39 μ l (0.417 mMol) Essigsäureanhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als Diastereomerengemisch (weisser Schaum). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.28$, FD-MS: $M^+ = 616$.

Beispiel 33: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 152 mg (0.221 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 34 mg (0.88 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als Diastereomerengemisch als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1)
 $R_f = 0.50$, FD-MS: $M^+ = 591$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Zur Lösung von 200 mg (0.348 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin in 2 ml Methylenchlorid werden bei 0° 179 μ l (1.04 mMol) Diisopropylethylamin und 108 mg (0.348 mMol) Glutarsäure-mono-2,4,5-trichlorphenylester-amid zugefügt und die weisse Suspension 2 Stunden bei 0° und 16 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach Einengen der nun farblosen Lösung am Rotationsverdampfer wird der ölige Rückstand in Methylenchlorid aufgenommen, mit 5% wässriger Zitronensäure und mit 1 N Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc.

Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.13$, FD-MS: $M^+ = 687$.

Beispiel 34: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin


5

Analog Beispiel 2 werden 210 mg (0.305 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 46 mg (1.22 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

10

15

20



als Diastereomerengemisch als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.56$, FD-MS: $M^+ = 591$.

25 Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

30

Analog Beispiel 33 werden 222 mg (0.386 mMol) des Diastereomerengemisches von (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 198 μ l (1.16 mMol) Diisopropylethylamin und 120 mg (0.386 mMol) Glutarsäure-mono-2,4,5-trichlorphenylester-amid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als Diastereomerengemisch als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.38$, FD-MS: $M^+ = 687$.

35


Beispiel 35: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-benzoyl-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

40

Analog Beispiel 2 werden 234 mg (0.440 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-benzoyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 67 mg (1.76 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung

45

50



55

als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.33$, FD-MS: $M^+ = 435$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-benzoyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Zur Lösung von 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin in 4 ml Methylenchlorid gibt man bei 0 ° 72 µl (0.515 mMol) Triethylamin und 54 µl (0.468 mMol) Benzoylchlorid. Man rührt das Reaktionsgemisch 3 Stunden bei 0 °, versetzt mit Wasser und extrahiert mit Methylenchlorid. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockne eingedampft. Das gelbe Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.72$, FD-MS: $M^+ = 531$.

Beispiel 36: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 254 mg (0.449 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 68 mg (1.80 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.29$, FD-MS: $M^+ = 470$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 35 werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 72 µl (0.515 mMol) Triethylamin und 60 µl (0.468 mMol) 3-Chlorbenzoylchlorid zum Produkt umgesetzt. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.71$, FD-MS: $M^+ = 566$.

Beispiel 37: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-(3-carboxamido-propionyl)-4-piperidinamin

Man gibt 92 mg (0.99 mMol) 1-Hydroxybenzotriazol und 138 mg (0.899 mMol) N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid zu einer Lösung von 181 mg (0.299 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-(3-carboxy-propionyl)-4-piperidinamin in 2 ml Tetrahydrofuran. Nach einer halben Stunde Rühren bei Raumtemperatur fügt man 2.1 ml (15 mMol) einer 7 M Lösung von Ammoniak in Ethanol dazu und rührt 36 Stunden bei Raumtemperatur. Man engt am Rotationsverdampfer ein, schlemmt den Rückstand in Methylenchlorid/Ether (1:1) auf und filtriert die weisse Suspension ab. Das Filtrat wird am Rotationsverdampfer eingengt und das gelbe Öl mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung




als weisse feste Substanz. DC: Methylenchlorid/Methanol/ conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.23$, FD-MS: $M^+ = 602, 604$.

Als Nebenprodukt wird aus der Chromatographie (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-(3-N-cyclohexyl-carbamido-propionyl)-4-piperidinamin erhalten. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.40$, FD-MS: $M^+ = 684, 686$.

Beispiel 38: (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2g werden 3.35 g (7.78 mMol) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-4-piperidinamin mit 1.34 g (8.56 mMol) Chinolin-4-carboxaldehyd und 1.3 g Magnesiumsulfat in 30 ml Toluol umgesetzt und anschliessend mit 324 mg (8.56 mMol) Natriumborhydrid in 25 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(3.5 g, 79%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.21$, FD-MS: $M^+ = 571$; $[\alpha]_D^{25} = +0.7$ (c = 1, MeOH), IR: 1635 cm^{-1} .

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

a) (2R,4R)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-4-hydroxy-piperidin

Zur Lösung von 26.9 g (92.3 mMol) (2R*,4R*)-2-Benzyl-1-t-butyloxycarbonyl-4-hydroxy-piperidin in 200 ml Pyridin werden bei 0 °C 24 g (111 mMol) (-)-Camphansäurechlorid geben und das heterogen werdende Gemisch 2 Stunden bei 0 °C und anschliessend 16 Stunden bei RT gerührt. Nach Einengen am Rotationsverdampfer wird das Reaktionsgemisch in Methylenchlorid aufgenommen, zweimal mit 10% Zitronensäure, einmal mit Wasser und einmal mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und am Rotationsverdampfer eingedampft.

Man erhält 47.8 g des diastereomeren Gemisches der Camphansäureester als oranges Öl. Diastereomer A: $R_f = 0.52$; Diastereomer B: $R_f = 0.47$.

Dieses wird mit Toluol/Ethylacetat (9:1) an Kieselgel chromatographiert und die diastereomeren Ester aus Hexan kristallisiert.

Man erhält das Diastereomer A in weissen Kristallen (14.2 g, 33%); Smp.: 114 - 115 °C und das Diastereomer B in weissen Kristallen (15.3 g, 35%); Smp.: 138 - 139 °C.

Die Lösung des Diastereomeren B in 300 ml Methanol wird mit 130 ml 0.5N Natronlauge versetzt und das Reaktionsgemisch während 18 Stunden bei RT gerührt. Nach Einengen am Rotationsverdampfer wird

das Reaktionsgemisch in Methylenchlorid aufgenommen, mit Wasser und Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und am Rotationsverdampfer eingedampft. Man erhält die Titelverbindung als gelbes Öl (9.3 g, 98%). DC: Toluol/Ethylacetat (7:3) $R_f = 0.34$, FD-MS: $M^+ = 291$, $[\alpha]_D = +32^\circ$ ($c = 1$, Methanol).

5 b) (2R,4R)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-4-(O-methylsulfonyl)-hydroxypiperidin

Analog Beispiel 2d werden 9.3 g (32 mMol) (2R,4R)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-4-hydroxy-piperidin mit 5 ml (63.8 mMol) Methansulfonsäurechlorid in 10 ml Pyridin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (11 g, 93%) als farblose Nadeln. Smp.: 137°C , DC: Toluol/Ethylacetat (4:1) $R_f = 0.42$, $[\alpha]_D = +21^\circ$ ($c = 1$, MeOH).

10 c) (2R,4S)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-4-piperidinazid

Analog Beispiel 2e werden 10.9 g (29.6 mMol) (2R,4R)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-4-(O-methylsulfonyl)-hydroxypiperidin mit 1.6 g (32.6 mMol) Lithiumazid in 60 ml N,N-Dimethylformamid umgesetzt.

Man erhält die Titelverbindung im Gemisch mit 2-Benzyl-N-*t*-butyloxycarbonyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin (9.2 g, Gewichtsverhältnis laut NMR: 4.7:1), welches nicht weiter aufgetrennt wird. DC: Toluol/Ethylacetat (9:1) $R_f = 0.59$.

20 d) (2R,4S)-2-Benzyl-4-piperidinazid

Das Gemisch aus Beispiel 38c (berechneter Gehalt an (2R,4S)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-4-piperidinazid: 7.58 g (80%)) wird mit 36 ml Trifluoressigsäure versetzt und 90 Minuten bei RT gerührt. Danach wird am Rotationsverdampfer eingeeengt, der Rückstand in Methylenchlorid aufgenommen und mit 2N Natronlauge gewaschen. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockene eingedampft. Der Rückstand wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Die Titelverbindung (4.7 g, 92%) wird als gelbes Öl erhalten. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.63$, IR: 2100 cm^{-1} , $[\alpha]_D = -28.8^\circ$ ($c = 1$, Methanol).

30 e) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-4-piperidinazid


Analog Beispiel 4a werden 2.2 g (10.2 mMol) (2R,4S)-2-Benzyl-4-piperidinazid mit 2.5 g (12.2 mMol) 3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzoesäure, 3.1 g (12.2 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 3.1 ml (22.4 mMol) Triethylamin. umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (4.16 g, 90%) als gelbes Öl. DC: Toluol/Ethylacetat (9:1) $R_f = 0.45$, FD-MS: $M^+ = 456$, $[\alpha]_D = +5.1^\circ$ ($c = 1$, Methanol).

f) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2f werden 4.1 g (9.0 mMol) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-4-piperidinazid mit 10% Pd/C hydriert. Man erhält die Titelverbindung (3.38 g, 87%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.47$, FD-MS: $M^+ = 430$, $[\alpha]_D = -3.0^\circ$ ($c = 1$, Methanol).

Beispiel 39: (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2g werden 1.95 g (5.37 mMol) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 0.93 g (5.90 mMol) Chinolin-4-carboxaldehyd und 0.9 g Magnesiumsulfat in 18 ml Toluol umgesetzt und anschließend mit 223 mg (5.90 mMol) Natriumborhydrid in 18 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(2.2 g, 82%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.35$, FD-MS: $M^+ = 503, 505$, $[\alpha]_D = -19.3$ ($c = 1$, MeOH), IR: 1635, 1595, 1565 cm^{-1} .

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

a) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinazin


Zur Lösung von 2.4 g (11.1 mMol) (2R,4S)-2-Benzyl-4-piperidinazin und 2.2 ml (15.5 mMol) Triethylamin in 35 ml Methylenchlorid tropft man bei 0 °C die Lösung von 2.8 g (13.3 mMol) 3,5-Dichlorbenzoylchlorid. Nach 18 Stunden Rühren bei 0 °C wird am Rotationsverdampfer eingeeengt, und das gelbe Öl zwischen Methylenchlorid und Wasser verteilt. Die organischen Phasen werden mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockene eingedampft. Das erhaltene Öl wird mit Toluol/Ethylacetat (9:1) an Kieselgel chromatographiert. Es wird die Titelverbindung (4.04 g, 94 %) als halbkristalline Masse erhalten. DC: Toluol/Ethylacetat (9:1) $R_f = 0.51$; FD-MS: $M^+ = 388, 390$; $[\alpha]_D = +33.4$ ($c = 1$, MeOH).

b) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2f werden 4.02 g (10.3 mMol) (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinazin mit 10% Pd/C hydriert. Man erhält die Titelverbindung (1.97 g, 52%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.40$, FD-MS: $M^+ = 362, 364$; IR: 3660, 3360, 1630 cm^{-1} ; $[\alpha]_D = +22.7$ ($c = 1$, Methanol).

Beispiel 40: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Die Lösung von 195 mg (0.325 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 26 mg (0.649 mMol) Natriumhydroxid in 2 ml Methanol und 2 ml Tetrahydrofuran lässt man 18 Stunden bei 0 °C rühren. Danach wird das Reaktionsgemisch eingeeengt, in Methylenchlorid aufgenommen und mit Wasser und Sole gewaschen. Die organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet und zur Trockene eingedampft. Das gelbe Öl wird mit Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (800:50:1) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält die Titelverbindung



(157 mg, 96%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.45$, FD-MS: $M^+ = 503, 505$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 35a werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 91 μ l (0.655 mMol) Triethylamin und 78 μ l (0.561 mMol) 2,4-Dichlorbenzoylchlorid zur Titelverbindung umgesetzt (240 mg, 86%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.57, FD-MS: M^+ = 599, 601.

Beispiel 41: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 40 werden 192 mg (0.352 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 141 μ l (0.704 mMol) 5N Natronlauge in 1 ml Tetrahydrofuran und 1 ml Methanol umgesetzt. Man erhlt die Titelverbindung



(73 mg, 46%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.43, FD-MS: M^+ = 449.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 35a werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 72 μ l (0.515 mMol) Triethylamin und 62 μ l (0.468 mMol) Phenylacetylchlorid zur Titelverbindung umgesetzt (208 mg, 81%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.54, FD-MS: M^+ = 545.

Beispiel 42: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,6-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 40 werden 138 mg (0.230 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,6-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 18.4 mg (0.460 mMol) Natriumhydroxid in 1.5 ml Tetrahydrofuran und 1.5 ml Methanol umgesetzt. Man erhlt die Titelverbindung



(56 mg, 48%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.50, FD-MS: M^+ = 503, 505.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 35a werden 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 91 μ l (0.655 mMol) Triethylamin und 80 μ l (0.561 mMol) 2,6-Dichlorbenzoylchlorid zur Titelverbindung umgesetzt (158 mg, 56%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.62, FD-MS: M^+ = 599, 601.

Beispiel 43: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dibrombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.166g (0.241 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dibrombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.037 g (0.96 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(0.094 g, 66%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.23, FD-MS: M^+ = 591, 593, 595


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dibrombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2a werden 197 mg (0.70 mMol) 3,5-Dibrombenzoesäure (hergestellt nach: J. Organometallic Chem. 215, 281 (1981)) zuerst mit 2 ml (27 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 130 μ l (0.936 mMol) Triethylamin zur Titelverbindung umgesetzt (168 mg, 52%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.60, FD-MS: M^+ = 687, 689, 691.

Beispiel 44: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.238 g (0.384 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.066 g (1.54 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(0.155 g, 79%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.36, FD-MS: M^+ = 523.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 78 mg (0.562 mMol) 9-Fluorencarbonsäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 μ l (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (241 mg, 82%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.58, FD-MS: M^+ = 619.

Beispiel 45: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.251 g (0.460 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.070 g (1.84 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(0.172 g, 83%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.27, FD-MS: M^+ = 449.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2a werden 96 mg (0.70 mMol) m-Toluylsäure zuerst mit 2 ml (27 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 118 μ l (0.842 mMol) Triethylamin zur Titelverbindung umgesetzt (251 mg, 98%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) R_f = 0.51, FD-MS: M^+ = 545.

Beispiel 46: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-brombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.271 g (0.444 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-brombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.067 g (1.78 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(0.212 g, 93%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.29$, FD-MS: $M^+ = 513, 515$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

5 (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-brombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2a werden 141 mg (0.70 mMol) m-Brombenzoesäure zuerst mit 2 ml (27 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.468 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 118 µl (0.842 mMol) Triethylamin zur Titelverbindung umgesetzt (271 mg,
10 95%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.71$, FD-MS: $M^+ = 609, 611$.

Beispiel 47: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.097 g (0.172 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.026 g (0.688 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man
15 erhält die Titelverbindung



(0.023 g, 29%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.57$,
20 FD-MS: $M^+ = 467$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

35 (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin


Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 87 mg (0.562 mMol) 3,5-Dihydroxybenzoesäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 µl (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (99 mg, 38%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1).
40 $R_f = 0.41$, FD-MS: $M^+ = 563$.

Beispiel 48: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-cyanbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.248 g (0.446 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-cyanbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.068 g (1.78 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die
45 Titelverbindung

50

55



(0.157 g, 62%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.51$,
FD-MS: $M^+ = 460$.


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-cyanobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-quinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 69 mg (0.514 mMol) 3-Cyanbenzoesäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 μ l (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (250 mg, 96%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.53$, FD-MS: $M^+ = 556$.

Beispiel 49: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chlorbenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.165 g (0.291 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chlorbenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 0.044 g (1.16 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die
Titelverbindung



(0.109 g, 80%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.33$,
MS: $M^+ = 469, 471$; IR: 3680, 1640, 1605, 1580 cm^{-1} .


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-quinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin mit 88 mg (0.560 mMol) 2-Chlorbenzoesäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 μ l (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (179 mg, 68%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.42$, FD-MS: $M^+ = 565, 567$.

Beispiel 50: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin.

Analog Beispiel 2 werden 0.202 g (0.291 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.054 g (1.43 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die
5 Titelverbindung




(0.136 g, 81%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.17$,
20 FD-MS: $M^+ = 469, 471$; IR: 3675, 1625, 1595, 1570 cm^{-1} .
Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

25 Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 88 mg (0.560 mMol) 4-Chlorbenzoesäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 144 μl (1.03 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (210 mg, 80%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.44$, FD-MS: $M^+ = 565, 567$.

30 Beispiel 51: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 40 werden 130 mg (0.219 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 500 μl (0.500 mMol) 1N Natronlauge in 1 ml Tetrahydrofuran und 1 ml
35 Methanol umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung




50 (49 mg, 45%) als weissen Schaum. DC: Toluol/Ethylacetat (1:1) $R_f = 0.26$; FD-MS: $M^+ = 495$.
Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

55 Analog Beispiel 25a werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 138 mg (0.561 mMol) 9-Bromfluoren und 155 mg (1.12 mMol) Kaliumcarbonat in 2.5 ml Aceton umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (131 mg, 47%) als Öl. DC: Toluol/Ethylacetat (1:1) $R_f = 0.43$; FD-MS: $M^+ = 591$.

Beispiel 52: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-methyl 4-piperidinamin


Zur Lösung von 150 mg (0.297 mMol) (2S*,4R*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin in 2 ml 1,2-Dimethoxyäthan werden bei 0 °C 13.4 mg (0.446 mMol) einer 80%igen Suspension von Natriumhydrid in Mineralöl (mit Hexan aufgeschlemmt und abdekantiert) in einer Portion zugegeben. Nach 10 Minuten bei 0 °C lässt man 30 Minuten bei RT rühren, kühlt wieder auf 0 °C ab und gibt 22 µl (0.357 mMol) Methyljodid dazu. Nun wird 96 Stunden bei RT gerührt. Man zieht das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer ab und chromatographiert den Rückstand mit Toluol/Ethylacetat (1:1) an Kieselgel. Man erhält die Titelverbindung



(20 mg, 13%) als weissen Schaum. DC: Toluol/Ethylacetat (1:1) $R_f = 0.45$; FD-MS: $M^+ = 517, 519$.

Beispiel 53: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-cyclohexylcarbamoyl-4-piperidinamin


Analog Beispiel 16a werden 200 mg (0.396 mMol) (2S*,4R*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin mit 66 µl (0.515 mMol) Cyclohexylisocyanat umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weisse Kristalle (165 mg, 66%) vom Schmelzpunkt 229 °C (Zersetzung). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.44$, FD-MS: $M^+ = 628, 630$.

Beispiel 54: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamin


Analog Beispiel 16a werden 200 mg (0.396 mMol) (2S*,4R*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin mit 45 mg (0.377 mMol) Phenylisocyanat umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als festen Rückstand (129 mg, 52%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.42$, FD-MS: $M^+ = 622, 624$.

Beispiel 55: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 0.130 g (0.231 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.035 g (0.923 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(0.101 g, 94%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.34$, FD-MS: $M^+ = 466, 468$.

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

a) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 11a werden 1g (3.44 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-4-piperidinamin mit 1 ml (4.48 mMol) Phenylacetaldehyd, 0.433 g (6.89 mMol) Natriumcyanoborhydrid, 0.791 g (9.64 mMol) Natriumacetat und 434 μ l Essigsäure zur Titelverbindung umgesetzt (805 mg, 60%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.35$, FD-MS: $M^+ = 394$.

b) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2h werden 618 mg (1.57 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin mit 240 μ l (1.72 mMol) Trifluoressigsäureanhydrid und 284 μ l (2.04 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als weissen Schaum (572 mg, 75%). DC: Toluol/Ethylacetat (9:1) $R_f = 0.47$, FD-MS: $(M + H)^+ = 491$.

c) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin


Analog Beispiel 38d werden 615 mg (1.25 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-*t*-butyloxycarbonyl-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 1.9 ml (25 mMol) Trifluoressigsäure umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung als Öl (308 mg, 63%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.63$, FD-MS: $M^+ = 390$.

d) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2a werden 189 mg (0.992 mMol) 3,5-Dichlorbenzoesäure zuerst mit 0.108 ml (1.49 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 155 mg (0.397 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin und 166 μ l (1.19 mMol) Triethylamin zur Titelverbindung umgesetzt (135 mg, 60%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.70, FD-MS: M^+ = 562, 564.

Beispiel 56: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 0.190 g (0.301 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin mit 0.046 g (1.21 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(0.123 g, 76%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.22, FD-MS: M^+ = 534, IR: 1630 cm^{-1} .


Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4a werden 150 mg (0.384 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(2-phenylethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 93 mg (0.461 mMol) 3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzoesäure, 117 mg (0.461 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 118 μ l (0.845 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (191 mg, 79%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) R_f = 0.79, FD-MS: M^+ = 630.

Beispiel 57: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-naphthoyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2a werden 142 mg (0.825 mMol) 2-Naphthoesäure zuerst mit 2 ml (27 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.550 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin und 138 μ l (0.991 mMol) Triethylamin zur Titelverbindung



umgesetzt (272 mg, 96%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) R_f = 0.73, FD-MS: $(M+H)^+$ = 516, 518, 520, IR: 3420, 1625 cm^{-1} .

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

a) (2R*,4S*)-2-Benzyl-4-piperidinazid

Analog Beispiel 38d werden 15g (38.3 mMol) des Gemisches aus Beispiel 2e mit 70 ml Trifluoressigsäure umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (7.15 g, 87%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.57$, FD-MS: $M^+ = 216$.

b) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinazid


Analog Beispiel 2a werden 6.62 g (34.7 mMol) 3,5-Dichlorbenzoesäure zuerst mit 3.78 ml (52.0 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 3.0 g (13.9 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-4-piperidinazid und 5.8 ml (41.6 mMol) Triethylamin zur Titelverbindung umgesetzt (5.18 g, 96%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.77$, DCI-MS: $(M + H)^+ = 389, 391$.

c) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2f werden 11.0 g (28.3 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinazid mit 10% Pd/C hydriert. Man erhält die Titelverbindung (8.76 g, 85%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.40$, FD-MS: $M^+ = 362, 364$.

20 Beispiel 58: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 2a werden 124 mg (0.825 mMol) 3,5-Dimethylbenzoesäure zuerst mit 2 ml (27 mMol) Thionylchlorid und anschliessend mit 200 mg (0.550 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin und 138 μ l (0.991 mMol) Triethylamin zum Produkt



umgesetzt (200 mg, 73%). DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.61$, FD-MS: $(M + H)^+ = 494, 496$; IR: 3420, 1625 cm^{-1}

40 Beispiel 59: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylylcarbonyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.550 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 105 mg (0.660 mMol) Chinolin-4-carbonsäure, 168 mg (0.661 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphorsäurechlorid und 169 μ l (1.21 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(278 mg, 97%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.45$, FD-MS: $M^+ = 517, 519$; IR: 3395, 1755, 1620 cm^{-1} .

Beispiel 60: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-indolylcarbonyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.550 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 106 mg (0.661 mMol) Indol-3-carbonsäure, 168 mg (0.661 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 169 μl (1.21 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(92 mg, 33%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (350:50:1) $R_f = 0.61$, FD-MS: $M^+ = 505, 507$; IR: 3450, 3260, 1770, 1635 cm^{-1} .

Beispiel 61: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-indolylcarbonyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.550 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 106 mg (0.661 mMol) Indol-2-carbonsäure, 168 mg (0.661 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 169 μl (1.21 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(89 mg, 32%) als weisse Kristalle vom Schmelzpunkt 254 °C. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.56$, FD-MS: $M^+ = 505, 507$; IR: 3430, 3290, 1625 cm^{-1} .

Beispiel 62: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(5-methoxy-2-indolylcarbonyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.550 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 126 mg (0.661 mMol) 5-Methoxy-indol-2-carbonsäure, 168 mg (0.661 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 169 μl (1.21 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(118 mg, 41%) als weisse Kristalle vom Schmelzpunkt 251 °C. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.81$, FD-MS: $M^+ = 535, 537$; IR: 3440, 3280, 1625 cm^{-1} .

Beispiel 63: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(1-naphthoyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 39a werden 150 mg (0.431 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinamin mit 75 μl (0.495 mMol) 1-Naphthoylchlorid und 81 μl (0.578 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(208 mg, 97%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.85$, FD-MS: $M^+ = 516, 518$; IR: 3680, 3400, 1620 cm^{-1} .

Beispiel 64: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(phenylacetyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 39a werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinamin mit 88 μl (0.661 mMol) Phenylacetylchlorid und 108 μl (0.771 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(127 mg, 48%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.56$, FD-MS: $M^+ = 480, 482$; IR: 3660, 3405, 1665, 1630 cm^{-1} .

Beispiel 65: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 2g werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 75 mg (0.551 mMol) 2-Methoxybenzaldehyd und 90 mg Magnesiumsulfat in 2 ml Toluol umgesetzt und anschliessend mit 22 mg (0.584 mMol) Natriumborhydrid in 2 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(170 mg, 64%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (700:50:1) $R_f = 0.66$, FD-MS: $M^+ = 482, 482$. IR: 1620 cm^{-1} .

Beispiel 66: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-(N-acetyl)-indolylmethyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 2g werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 113 mg (0.606 mMol) N-Acetylindol-3-carboxaldehyd und 90 mg Magnesiumsulfat in 2 ml Toluol umgesetzt und anschliessend mit 31 mg (0.826 mMol) Natriumborhydrid in 3 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(30 mg, 10%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.57$, FD-MS: $M^+ = 533, 535$. IR: $1720, 1680, 1635\text{ cm}^{-1}$.

Beispiel 67: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-benzo[b]furanlylmethyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 2g werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 97 mg (0.661 mMol) Benzofuran-2-carboxaldehyd und 90 mg Magnesiumsulfat in 2 ml Toluol umgesetzt und anschliessend mit 22 mg (0.584 mMol) Natriumborhydrid in 2 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(150 mg, 55%) als Öl. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.18$, FD-MS: $M^+ = 492, 494$. IR: 1630 cm^{-1} .

Beispiel 68: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-[(3-methylbenzo[b]thiophen-2-ylmethyl)]-4-piperidinamin


Analog Beispiel 2g werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinamin mit 116 mg (0.661 mMol) 3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd und 90 mg Magnesiumsulfat in 2 ml Toluol umgesetzt und anschliessend mit 22 mg (0.584 mMol) Natriumborhydrid in 2 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(75 mg, 25%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (2000:50:1) $R_f = 0.38$, FD-MS: $M^+ = 522, 524$. IR: 1630 cm^{-1} .

Beispiel 69: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-methoxyindol-3-ylmethyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 2g werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinamin mit 116 mg (0.661 mMol) 5-Methoxyindol-3-carboxaldehyd und 90 mg Magnesiumsulfat in 2 ml Toluol umgesetzt und anschliessend mit 22 mg (0.584 mMol) Natriumborhydrid in 2 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(98 mg, 34%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.42$, FD-MS: $M^+ = 521, 523$. IR: $3460, 1630\text{ cm}^{-1}$.

Beispiel 70: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-indolylmethyl)-4-piperidinamin


Analog Beispiel 2g werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 80 mg (0.551 mMol) Indol-3-carboxaldehyd und 90 mg Magnesiumsulfat in 2 ml Toluol umgesetzt und anschliessend mit 22 mg (0.584 mMol) Natriumborhydrid in 2 ml Methanol reduziert. Man erhält die Titelverbindung



(75 mg, 28%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (400:50:1) $R_f = 0.49$, FD-MS: $M^+ = 491, 493$. IR: 3460, 1630 cm^{-1} .

Beispiel 71: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamin


Analog Beispiel 16a werden 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin mit 85 mg (0.716 mMol) Phenylisocyanat umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum (160 mg, 60%). DC: Toluol/Ethylacetat (1:1) $R_f = 0.40$, FD-MS: $M^+ = 481, 483$; IR: 1600 - 1690 cm^{-1} .

Beispiel 72: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-diphenylmethyl-4-piperidinamin


Die Lösung von 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-4-piperidinamin und 110 mg (0.606 mMol) Benzophenon in 5 ml Toluol wird 18 Stunden am Rückfluss gehalten. Danach engt man am Rotationsverdampfer ein, löst das Reaktionsgemisch in 3 ml Methanol und fügt bei RT 69 mg (1.10 mMol) Natriumcyanoborhydrid dazu. Mit 80 μl Essigsäure wird das Reaktionsgemisch auf pH = 5 gestellt und 68 Stunden bei RT gerührt. Man erhält die Titelverbindung



als weissen Schaum (120 mg, 41%). DC: Toluol/Ethylacetat (7:3) $R_f = 0.79$, FD-MS: $M^+ = 528, 530$; IR: 1630 cm^{-1} .

Beispiel 73: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonyl)-4-piperidinamin


Zur Lösung von 108 mg (0.606 mMol) 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonsäure in 3 ml Tetrahydrofuran gibt man bei 0°C 125 mg (0.606 mMol) N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, rührt das Reaktionsgemisch eine Stunde und fügt $177\text{ }\mu\text{l}$ (1.27 mMol) Triethylamin und 200 mg (0.551 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-4-piperidinamin dazu. Man lässt auf RT erwärmen und rührt 16 Stunden bei dieser Temperatur. Man engt am Rotationsverdampfer ein, schlemmt den Rückstand in Methylenchlorid/Ether (1:1) auf und filtriert die weisse Suspension ab. Nach Einengen am Rotationsverdampfer wird das Reaktionsgemisch in Methylenchlorid aufgenommen, zweimal mit 10% Zitronensäure, einmal mit Wasser, einmal mit 2N Natronlauge und einmal mit Sole gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und am Rotationsverdampfer eingedampft. Das gelbe Öl wird mit Toluol/Ethylacetat (7:3) an Kieselgel chromatographiert. Man erhält das Diastereomerengemisch der Titelverbindung



als weissen Schaum (69 mg, 24%). DC: Toluol/Ethylacetat (1:1) $R_f = 0.56$, FD-MS: $M^+ = 522, 524$; IR: $3410, 1675, 1630\text{ cm}^{-1}$.

Beispiel 74: (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 2 werden 0.175 g (0.321 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoracetyl-4-piperidinamin mit 0.047 g (1.25 mMol) Natriumborhydrid umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung



(0.100 g, 69%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.21$,
FD-MS: $M^+ = 465$; IR: 1620 cm^{-1} .

Die Ausgangsverbindung dazu wird wie folgt hergestellt:

(2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-4-piperidinamin

Analog Beispiel 4a werden 200 mg (0.467 mMol) (2R*,4S*)-2-Benzyl-N-(4-chinolylmethyl)-N-trifluoroacetyl-1-piperidinamin mit 85 mg (0.562 mMol) p-Anissäure, 143 mg (0.561 mMol) Bis-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-phosphinsäurechlorid und 91 μl (0.655 mMol) Triethylamin umgesetzt. Man erhält die Titelverbindung (170 mg, 65%) als weissen Schaum. DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (1000:50:1) $R_f = 0.37$, FD-MS: $M^+ = 561$.

Beispiel 75:

In analoger Weise wie in den Beispielen 1 bis 74 beschrieben kann man ferner herstellen:

- (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-N-carbamoyl-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-methoxyphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-methoxyphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(3-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(3-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(3-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(3-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(4-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(4-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(4-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(4-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2,3-dimethoxybenzyl)-4-piperidinamin;
- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2,3-dimethoxybenzyl)-4-piperidinamin;
- (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2,3-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;

[illegible]


(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-[2-(4-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-[3-(4-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-[3-(4-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 5 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3,4-ethyldioxybenzyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3,4-ethyldioxybenzyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(indol-2-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(indol-2-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 10 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(indol-3-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(indol-3-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(chinolin-2-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(chinolin-2-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(chinolin-3-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 15 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(chinolin-3-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(2-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(2-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(2-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(2-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 20 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(2-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(2-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 25 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 30 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 35 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethyldioxybenzyl)-4-piperidinamin und
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethyldioxybenzyl)-4-piperidinamin.

40 Beispiel 76: (2R,4S)- und (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin-
dihydrochlorid

Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 1.26 g (3.9 mMol) (2R,4R/S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin, erhalten als Gemisch von ca 70% (2R,4R)- und ca 30% (2R,4S)-Diastereomeren durch Reduktion mittels Borandimethylsulfid gemäss Beispiel e1b, und unter Verwendung von insgesamt
 45 2.26 g (14.4 mMol) Chinolin-4-carboxaldehyd ein Gemisch der Hydrochloride der beiden diastereomeren Titelverbindungen.

50

55



15 DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (90:9:1)

Diastereomer A (2R,4R): $R_f = 0.5$, MS: $M^+ = 463$

Diastereomer B (2R,4S): $R_f = 0.45$, MS: $M^+ = 463$, Smp. 144-145°, $[\alpha]_D = +25^\circ$ ($c = 0.94$ in Ethanol)

20 Diese werden gelöst in Essigester mit etherischer HCl-Lösung behandelt, wobei man das Dihydrochlorid der Titelverbindung erhält.

DC: Methylenchlorid/Methanol/conc. Ammoniak (90:9:1)

Diastereomer A (2R,4R): $R_f = 0.5$, Smp. 172-174°, $[\alpha]_D = -55.7^\circ$ ($c = 1$, Ethanol)

Diastereomer B (2R,4S): $R_f = 0.45$, Smp. 174-176°, $[\alpha]_D = +18^\circ$ ($c = 1$, Ethanol)

25 Beispiel 77: (2S,4R) und (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamin-hydrochlorid

30 Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 1.87 g (5.8 mMol) (2S,4R/S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin, erhalten als Gemisch von ca 70% (2S,4S)- und ca 30% (2S,4R)-Diastereomeren durch Reduktion mittels Borandimethylsulfid gemäss Beispiel e1b, und unter Verwendung von Phenylacetaldehyd die Hydrochloride der beiden diastereomeren Titelverbindungen.

DC: Methylenchlorid/Methanol (98:2)

35 Diastereomer A (2S,4S): $R_f = 0.16$, Smp. 250-251°C, $[\alpha]_D = +56.2^\circ$ ($c = 0.980$, Methanol), MS: $M^+ = 426$ (freie Base).

Diastereomer B (2S,4R): $R_f = 0.06$, Smp. 250°C (Zersetzung), $[\alpha]_D = -29.7^\circ$ ($c = 0.768$, Methanol), MS: $M^+ = 426$ (freie Base).

40 Beispiel 78: (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 511 mg (1.59 mMol) (2R,4RS)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin unter Verwendung von Chinolin-3-carbaldehyd die Titelverbindung durch Kristallisation aus Hexan/Ethylacetat (1:1) in Form farbloser Kristalle.

DC: Methylenchlorid/Methanol/konz. Ammoniak (90:9:1)

45 $R_f = 0.5$, Smp. 91-93°C, MS: $M^+ = 463$ (freie Base), $[\alpha]_D = +0.7^\circ$ ($c = 1.09$, Methanol)

Beispiel 79: (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-chinolylmethyl)-4-piperidinamin-dihydrochlorid

50 Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 541 mg (1.68 mMol) (2R,4RS)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin unter Verwendung von Chinolin-2-carbaldehyd die Titelverbindung.

DC: Methylenchlorid/Methanol/konz. Ammoniak (90:9:1)

$R_f = 0.5$, Zersetzungspunkt: ab 110°C, MS: $M^+ = 463$ (freie Base), $[\alpha]_D = +4.8^\circ$ ($c = 1.105$, Methanol)

55 Beispiel 80: (2R,4S)- und (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamin-hydrochlorid

Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 0.748 g (2.32 mMol) (2R,4R/S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin, erhalten als Gemisch von ca 70% (2R,4R)- und ca 30% (2R,4S)-Diastereomeren durch Reduktion mittels Borandimethylsulfid gemäss Beispiel e1b, und unter Verwendung von Benzaldehyd

die Hydrochloride der beiden diastereomeren Titelverbindungen.

DC: Methylenchlorid/Methanol/konz. Ammoniak (95:4.5:0.5)

Diastereomer A (2R,4R): $R_f = 0.45$, Smp. 244-246 °C, $[\alpha]_D = -50.4^\circ$ ($c = 0.979$, Chloroform), MS: $M^+ = 412$ (freie Base).

5 Diastereomer B (2R,4S): $R_f = 0.33$, amorph.

$[\alpha]_D = +7.9^\circ$ ($c = 1.0$, Chloroform), MS: $M^+ = 412$ (freie Base).

Beispiel 81: (2S,4R)- und (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamin-hydrochlorid

10 Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 4.5 g (13.95mMol) (2S,4R/S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin, erhalten als Gemisch von ca 70% (2S,4S)- und ca 30% (2S,4R)-Diastereomeren durch Reduktion mittels Borandimethylsulfid gemäss Beispiel e1b, und unter Verwendung von Benzaldehyd die Hydrochloride der beiden diastereomeren Titelverbindungen.

DC: Methylenchlorid/Methanol/konz. Ammoniak (95:4.5:0.5)

15 Diastereomer A (2S,4S): $R_f = 0.45$, Smp. 246-247 °C, $[\alpha]_D = +51.2^\circ$ ($c = 0.672$, Chloroform), MS: $M^+ = 412$ (freie Base).

Diastereomer B (2S,4R): $R_f = 0.33$, amorph.

$[\alpha]_D = -7.7^\circ$ ($c = 0.784$, Chloroform), MS: $M^+ = 412$ (freie Base).

20 Beispiel 82: (2R,4S)- und (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-pyridylmethyl)-4-piperidinamin-dihydrochlorid

Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 100mg (0.279 mMol) (2R,4R/S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin, erhalten als Gemisch von ca 70% (2R,4R)- und ca 30% (2R,4S)-Diastereomeren durch Reduktion mittels Borandimethylsulfid gemäss Beispiel e1b, und unter Verwendung von Pyridin-4-carbaldehyd die beiden diastereomeren Titelverbindungen.

DC: Methylenchlorid/Methanol/konz. Ammoniak (90:9:1)

Diastereomer A (2R,4R): $R_f = 0.68$, ab 142 °C Zersetzung, $[\alpha]_D = -57.3^\circ$ ($c = 0.508$, Ethanol), MS: $M^+ = 413$ (freie Base).

30 Diastereomer B (2R,4S): $R_f = 0.44$, ab 145 °C Zersetzung, $[\alpha]_D = +23.0^\circ$ ($c = 0.300$, Ethanol), MS: $M^+ = 413$ (freie Base).

Beispiel 83: (2R,4S)- und (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-pyridylmethyl)-4-piperidinamin-dihydrochlorid

35 Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 100mg (0.279 mMol) (2R,4R/S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin, erhalten als Gemisch von ca 70% (2R,4R)- und ca 30% (2R,4S)-Diastereomeren durch Reduktion mittels Borandimethylsulfid gemäss Beispiel e1b, und unter Verwendung von Pyridin-3-carbaldehyd die beiden diastereomeren Titelverbindungen.

40 DC: Methylenchlorid/Methanol/konz. Ammoniak (90:9:1)

Diastereomer A (2R,4R): $R_f = 0.68$, ab 105 °C Zersetzung, $[\alpha]_D = -52.6^\circ$ ($c = 1.06$, Ethanol), MS: $M^+ = 413$ (freie Base).

Diastereomer B (2R,4S): $R_f = 0.44$, ab 105 °C Zersetzung, $[\alpha]_D = +22.6^\circ$ ($c = 1.03$, Ethanol), MS: $M^+ = 413$ (freie Base).

45 Beispiel 84: (2S,4R) und (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

50 Analog Beispiel 1 erhält man ausgehend von 12.1g (37.5mMol) (2S,4RS)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin, erhalten als Gemisch von ca 70% (2S,4S)- und ca 30% (2S,4R)-Diastereomeren durch Reduktion mittels Borandimethylsulfid gemäss Beispiel e1b, und unter Verwendung von Chinolin-4-carbaldehyd die beiden diastereomeren Titelverbindungen.

DC: Methylenchlorid/Methanol/konz. Ammoniak (90:9:1)

Diastereomer A (2S,4R): $R_f = 0.59$, Smp. 144-145 °C (freie Base) $[\alpha]_D = -25.1^\circ$ ($c = 1.0$, Ethanol), MS: $M^+ = 463$ (freie Base)



55

Beispiel 85: (2R*,4S*,1'R*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-benzyl)-4-piperidinamin (Diastereomer A) und (2R*,4R*,1'R*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidinamin (Diastereomer B)

5

10

15

AB

20

Eine Lösung vom 400 mg (1.18 mMol) (2R*,1'R*-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidon und 139 mg (1.3 mMol) Benzylamin in Toluol/Hexan wird unter azeotroper Entfernung von Wasser 18 Stunden zum Rückfluss erhitzt. Die Reaktionsmischung wird unter vermindertem Druck eingeeengt und das zurückbleibende Öl in Methanol aufgenommen, bei 0 bis 5° mit 111 mg Natriumcyanoborhydrid (85 % in Mineralöl) versetzt und 4 Stunden bei 25° gerührt. Das Lösungsmittel wird unter vermindertem Druck abgezogen und das Rohprodukt in einem Gemisch von Essigsäureethylester und 10 %-iger Natriumcarbonatlösung aufgenommen. Die organische Phase wird abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck eingedampft. Chromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester als Laufmittel ergibt die beiden Titelverbindungen; TLC (Essigsäureethylester):

30

Diastereomer A: $R_f = 0.28$; Smp. 159-160°

Diastereomer B: $R_f = 0.09$; Smp. 190-192°.

Das Ausgangsmaterial kann folgendermassen hergestellt werden:

35 a) 1-tert.-Butoxycarbonyl-4-piperidon-ethylenketal

Zu einer Lösung von 14.3 g 4-Piperidonethylenketal in 100 ml Toluol werden unter Rühren bei 0 bis 5° langsam 26.1 g Ditertiärbutyldicarbonat, gelöst in 20 ml Toluol zugegeben. Man lässt 2 Stunden bei Raumtemperatur rühren und dampft dann unter vermindertem Druck ein und destilliert unter vermindertem Druck. Man erhält 22.2 g der Titelverbindung, Sdp. 83-85° (0.2 Torr). TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:3): $R_f = 0.20$.

40

45 b) (2R*,1'R*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidonethylenketal (Diastereomer A) und (2R*,1'S*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidonethylenketal (Diastereomer B)

24.3 g (100mMol) 1-tert.-Butoxycarbonyl-4-piperidonethylenketal und 32.8 ml Tetramethylethyldiamin werden in 100 ml Diethylether gelöst, auf -70° gekühlt und langsam mit 87.5 ml (120 mMol) einer Lösung von Sekundärbutyllithium (1.4-molare Lösung in Cyclohexan/Isopentan) versetzt. Man lässt 4 Stunden bei -70° nachrühren, fügt dann in einem Guss 12.72 g (120 mMol) Benzaldehyd hinzu und lässt auf 0° erwärmen. Das Reaktionsgemisch wird mit gesättigter Ammoniumchloridlösung versetzt und mit Essigsäureethylester ausgeschüttelt. Die organische Phase wird abgetrennt, mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck eingedampft. Chromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester als Laufmittel ergibt 12.2 g an Diastereomer A und 21.6 g an Diastereomer B der Titelverbindung. TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1):


55

Diastereomer A (2R*,1'R*): $R_f = 0.43$, Smp. 133-134°

Diastereomer B (2R*,1'S*): $R_f = 0.34$, Smp. 114-116°

c) 2-(1'-Hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidon

Eine Suspension von 2.6 g (7.44 mMol)(2R*,1'R*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidonethylenketal in 30 ml 6N Salzsäure wird 1 Stunde auf 60 ° erhitzt, dann abgekühlt, mit Natriumcarbonat neutralisiert und mit Essigsäureethylester ausgeschüttelt. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck eingedampft. Man erhält die Titelverbindung vom Smp. 124-126 °; $R_f = 0.26$ (Methylenchlorid/Methanol/25 %-ige wässrige Ammoniaklösung, 90:9.5:0.5).

d) (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidon

Das wie vorstehend unter c) beschrieben althitene rohe 2-(1'-Hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidon wird in einem Gemisch von 20 ml Dichlormethan und 20 ml gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung aufgenommen, unter Rühren auf 0-5 ° gekühlt und innerhalb von 1.5 Stunden tropfenweise mit 1.5 g (8.9 mMol) 3,5-Dimethylbenzoylchlorid versetzt. Man lässt 1 Stunde nachrühren, verdünnt mit Essigsäureethylester, wäscht nacheinander mit 1N-HCl und gesättigter Kochsalzlösung, trocknet über Natriumsulfat und dampft unter vermindertem Druck zur Trockne ein. Die Titelverbindung kann durch Chromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester/Hexan (1:1) als Laufmittel gereinigt werden. TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1): $R_f = 0.19$, FD-MS: $M + = 338$.

In analoger Weise wie vorstehend unter b), c) und d) beschrieben kann man auch die nachstehenden Verbindungen herstellen:



(2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluormethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon, TLC (Essigester/Hexan; 1:1): $R_f = 0.35$; FD-MS: 479,481;
 (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon, TLC (Essigester/Hexan; 1:1): $R_f = 0.16$, Smp.: 222-223 °;
 (2R*,1'S*)-1-(3,5-Bistrifluormethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluormethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon
 (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon und
 (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)-methyl}-4-piperidon.

Beispiel 86: (2R*,4S*,1'R*)-2-(1'-Hydroxy-1'-phenyl-methyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer A) und (2R*,4R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer B)

5

10

15

AB

20

Die Titelverbindung kann in analoger Weise wie in Beispiel 85 beschrieben ausgehend von 4-Chinolylmethylamin hergestellt werden. Sie wird durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester und Essigsäureethylester/Methanol (50:1) als Laufmittel in die Diastereomeren aufgetrennt und gereinigt. TLC (Essigsäureethylester):

25

Diastereomer A (2R*,4S*,1'R*): $R_f = 0.08$, FD-MS: $M^+ = 479$



Diastereomer B (2R*,4R*,1'R*): $R_f = 0.01$, FD-MS: $M^+ = 479$

Beispiel 87: (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer A) und (2R*,4R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer B)

30

35

40

AB

45

50

Die Titelverbindung kann in analoger Weise wie in Beispiel 85 beschrieben ausgehend von 420 mg (1.24 mMol) (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-chinolylmethylamin hergestellt werden. Sie wird durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester und Dichlormethan/Methanol/35%-ige Ammoniaklösung (95:4.5:0.5) als Laufmittel in die Diastereomeren aufgetrennt und gereinigt. TLC (Essigsäureethylester):

55

Diastereomer A (2R*,4S*,1'S*): $R_f = 0.08$, FD-MS: $M^+ = 479$


Diastereomer B (2R*,4R*,1'S*): $R_f = 0.01$, FD-MS: $M^+ = 479$

Das Ausgangsmaterial kann z.B. folgendermassen hergestellt werden:

a) (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidon

Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 1c beschrieben aus 860 mg (2.46 mMol) (2R*,1'S*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidonethylenketal (Beispiel 1b) hergestellt und durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester/Hexan (2:3) als Laufmittel gereinigt werden. TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1): R_f = 0.24; FD-MS: M^+ = 337.

Beispiel 88: (2R*,4S*,1'R*)-2-{1'-Hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer A) und (2R*,4R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer B)



Die Titelverbindung kann in analoger Weise wie in Beispiel 1 aus 310 mg (0.833 mMol) (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon und 145 mg (0.92 mMol) 4-Chinolylmethylamin hergestellt und durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester/Isopropanol (95:5 - 90:10) als Laufmittel aufgetrennt und gereinigt werden. TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung (90:9.5:0.5))

Diastereomer A (2R*,4S*,1'R*): R_f = 0.47, FD-MS: $(M+1)^+$ = 514

Diastereomer B (2R*,4R*,1'R*): R_f = 0.35, FD-MS: M^+ = 513

Das Ausgangsmaterial kann z.B. folgendermassen hergestellt werden:

a) (2R*,1'R*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidonethylenketal (Diastereomer A) und (2R*,1'S*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidonethylenketal (Diastereomer B)

Die Titelverbindung kann in analoger Weise wie in Beispiel 1b beschrieben ausgehend von 4-Chlorbenzaldehyd hergestellt, durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester/Hexan (1:3) als Laufmittel aufgetrennt und gereinigt werden sowie aus Essigsäureethylester/Hexan kristallisiert werden. TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1):

Diastereomer A (2R*,1'R*): R_f = 0.44, Smp. 129-130 °

Diastereomer B (2R*,1'S*): R_f = 0.35, Smp. 160-161 °

b) (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon

Die Titelverbindung kann in analoger Weise wie in Beispiel 1c beschrieben hergestellt werden und kristallisiert aus Essigsäureethylester. Smp. 222-225 °; TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1): R_f = 0.17



Beispiel 89: (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer A) und (2R*,4R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer B)

5

10

15

20

AB

Die Titelverbindung kann in analoger Weise wie in Beispiel 1 ausgehend von (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon als Ausgangsmaterial hergestellt und durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung (95:4.5:0.5) als Laufmittel aufgetrennt und gereinigt werden. TLC (Essigsäure):

Diastereomer A (2R*,4S*,1'S*): $R_f = 0.24$, FD-MS: $M^+ = 514$

Diastereomer B (2R*,4R*,1'S*): $R_f = 0.06$, FD-MS: $M^+ = 514$

Das Ausgangsmaterial kann beispielsweise wie folgt hergestellt werden:

a) (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon



Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 1c beschrieben ausgehend von (2R*,1'S*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidonethylenketal (Beispiel 4a, Diastereomer B) hergestellt. Smp. 195-197 °; TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1): $R_f = 0.26$

Beispiel 90: (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer A) und (2R*,4R*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin (Diastereomer B)

45

50

55

AB

Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 1 beschrieben ausgehend von (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon hergestellt und durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung (93:6.5:0.5) als Laufmittel aufgetrennt. TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung; 90:9.5:0.5):

5 Diastereomer A (2R*,4S*,1'S*): $R_f = 0.38$; Smp. 138-140°

Diastereomer B (2R*,4R*,1'S*): $R_f = 0.22$; Smp. 188-190°

Das Ausgangsmaterial kann beispielsweise wie folgt hergestellt werden.

10 a) (2R*,1'R*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidonethylenketal (Diastereomer A) und (2R*,1'S*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidonethylenketal (Diastereomer B)

Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 1b beschrieben ausgehend von 3,4-Dichlorbenzaldehyd statt Benzaldehyd erhalten. Die Diastereomeren werden durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester/Hexan (1:3) als Laufmittel aufgetrennt und aus Essigsäureethylester/Hexan kristallisiert. TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1):

15 Diastereomer A (2R*,1'R*): $R_f = 0.57$, IR-Spektrum (Methylenchlorid): 3700-3300, 1680 cm^{-1}

Diastereomer B (2R*,1'S*): $R_f = 0.48$, Smp. 160-162°

20 b) (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon


Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 1c aus (2R*,1'S*)-1-tert.-Butoxycarbonyl-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidonethylenketal hergestellt und aus Essigsäureethylester/Hexan kristallisiert; Smp. 152-152.5°; TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1), $R_f = 0.24$

25

Beispiel 91: (2R*,4S*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-4-piperidinamin

Eine Lösung von 30 mg (2R*,4R*,1'R*)-N-Benzyl-N-trifluoracetyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-4-piperidinamin in 5 ml Methanol und 1 ml 5N Natriumhydroxidlösung wird 10 Minuten auf 60° erhitzt. Man lässt auf Raumtemperatur abkühlen, verdünnt mit 10%-iger wässriger Natriumhydrogencarbonatlösung und schüttelt zweimal mit Dichlormethan aus. Die organischen Phasen werden vereinigt, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Die Titelverbindung der Formel

35



40

45

wird durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Essigsäureethylester als Laufmittel erhalten. TLC (Essigsäureethylester): $R_f = 0.17$; IR-Spektrum (Methylenchlorid): 1685, 1625, 1500 cm^{-1} .

Das Ausgangsmaterial kann beispielsweise folgendermassen erhalten werden:

50

a) (2R*,4R*,1'R*)-N-Benzyl-N-trifluoracetyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-4-piperidinamin


Eine Lösung von 80 mg (0.19 mMol) (2R*,4R*,1'R*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidinamin (Beispiel 1, Diastereomer B) in 1 ml Pyridin wird bei 0° mit 0.167 ml Trifluoracethanhydrid versetzt und 2 Stunden bei 0° gerührt. Das Reaktionsgemisch wird mit Diethylether und Wasser verdünnt und in die Phasen getrennt. Die organische Phase wird mit 4N Salzsäure und gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Das Rohprodukt wird zur Entfernung zweifach trifluoracetylierter Nebenprodukte in 3

55

ml Ethanol und 0.5 ml Triethylamin auf 55 ° erhitzt und erneut unter vermindertem Druck eingedampft. Der Rückstand wird in 3 ml Dichlormethan, enthaltend 3 Å Molekularsieb aufgenommen und mit 5 mg Tetrapropylammoniumperruthenat und 100 mg Morpholin-N-oxid versetzt. Man lässt 16 Stunden rühren, filtriert, verdünnt mit Dichlormethan, wäscht nacheinander mit Natriumhydrogensulfatlösung, gesättigter Kochsalzlösung und 5%-iger Kupfersulfatlösung, trocknet über Natriumsulfat, dampft unter vermindertem Druck ein und kristallisiert aus Diethylether/Hexan; Smp. 138-139 °; TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:1): $R_f = 0.71$.

Beispiel 92: (2R*,4S*)-2-(4-Chlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin

Ein Gemisch von 550 mg (1.54 mMol) (2R*,4S*)-2-(4-Chlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin und 242 mg (1.54 mMol) 4-Chinolinecarboxaldehyd wird in 30 ml Toluol gelöst und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Dies wird noch zweimal wiederholt. Der Rückstand wird in 10 ml Ethanol aufgenommen, mit 70 mg (1.85 mMol) Natriumborant versetzt und 3 Stunden bei 25 ° gerührt. Man säuert mit 1N Salzsäure an und lässt 1 Stunde nachrühren. Das Reaktionsgemisch wird in gesättigte wässrige Natriumcarbonatlösung eingegossen und mit Essigsäureethylester extrahiert. Die organische Phase wird mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Das Rohprodukt wird zweimal aus Essigsäureethylester umkristallisiert und ergibt die Titelverbindung der Formel



in Form weisser Kristalle; Smp. 148-9 °; MS: $M + 497$.

Die Ausgangsstoffe können beispielsweise wie folgt hergestellt werden:

a) N-{5-(4-Chlorphenyl)pent-1-en-4-yl}-3,5-dimethylbenzamid

Zu einer bei 0 ° gerührten Lösung von 5.0 g (25.6 mMol) N-[1-(4-Chlorphenyl)pent-4-en-2-yl]amin und 5.33 ml (38.4 mMol) Triethylamin in 100 ml Dichlormethan werden innerhalb von 2 Stunden 4.3 g (25.6 mMol) 3,5-Dimethylbenzoylchlorid zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird noch 1 Stunde weitergerührt, mit 1N Salzsäure versetzt und mit Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit gesättigter Kochsalzlösung neutralgewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck eingedampft. Das Rohprodukt wird aus Essigsäureethylester/Hexan kristallisiert und ergibt 7.36 g (88 %) weisse Kristalle; Smp. 116-118 °; TLC (Hexan/Essigsäureethylester; 3:1): $R_f = 0.37$

b) N-{5-(4-Chlorphenyl)pent-1-en-4-yl}-N-ethoxymethyl-3,5-dimethylbenzamid

Zu einer heftig gerührten Lösung von 5.5 g (16.8 mMol) N-{5-(4-Chlorphenyl)pent-1-en-4-yl}-3,5-dimethylbenzamid und 100 mg Benzyltributylammoniumchlorid in 15 ml 50 %-iger wässriger Natriumhydroxidlösung und 15 ml Dichlormethan werden bei 0-5 ° innerhalb von 2 Stunden 2.36 ml (25.2 mMol) Chlormethylethylether in kleinen Portionen zugegeben. Die organische Phase wird in Dichlormethan und Wasser aufgenommen, die organische Phase abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Der ölige Rückstand wird an Silicagel mit Essigsäureethylester/Hexan (1:4) als Laufmittel chromatographisch gereinigt; TLC (Essigsäureethylester/Hexan; 1:3): $R_f = 0.50$;

$^1\text{H-NMR}$ (300 MHz, CDCl_3): Gemisch von Rotameren, $\delta = 7.31-7.18$ (m, 4H), 7.04-6.85 (m, 2.6H), 6.42 (br. s, 0.4H), 5.92-5.60 (m, 1H), 5.20-5.02 (m, 2H), 4.54-4.24 (m, 2H), 3.96-3.67 (m, 1H), 3.25-2.40 (m, 6H), 2.28

(s, ca 5H), 2.24 (s, ca 1H), 1.34-1.21 (m, ca 0.5H), 1.08 (t, J = 7, ca 2.5H).

c) (2R*,4S*)-2-(4-Chlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-acetyl-4-piperidinamin


5 Zu einer auf -20° gekühlten Lösung von 1.0 g N-{5-(4-Chlorphenyl)pent-1-en-4-yl}-N-ethoxymethyl-3,5-dimethylbenzamid in Acetonitril gibt man nacheinander 0.61 ml Zinntetrachlorid und 0.24 ml Acetanhydrid. Die Reaktionsmischung wird 2 Stunden bei -20° und 1 Stunde bei 25° nachgerührt, in gesättigte wässrige Natriumhydrogencarbonatlösung gegossen und mit Essigsäureethylester ausgezogen. Die organische Phase wird abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Die rohe Titelverbindung (oranges Öl) wird durch Chromatographie an Silicagel mit Dichlormethan/Methanol/25 %ige Ammoniaklösung (95:5:0.1) als Laufmittel gereinigt. TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %ige Ammoniaklösung; 90:10:0.1): R_f = 0.45; FD-MS: M⁺ = 398

d) (2R*,4S*)-2-(4-Chlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin

15 Eine Suspension von 730 mg (1.83 mMol) (2R*,4S*)-2-(4-Chlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-acetyl-4-piperidinamin in 6N Salzsäure wird 16 Stunden auf 100° erhitzt, wobei der Ausgangsstoff in Lösung geht. Das Reaktionsgemisch wird mit 10 %iger wässriger Natriumcarbonatlösung basisch gestellt und mit Essigsäureethylester ausgezogen. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Die rohe Titelverbindung wird an Silicagel mit Dichlormethan/Methanol/25 %ige Ammoniaklösung (90:10:0.1) als Laufmittel chromatographisch gereinigt und als fast farbloses Harz erhalten. TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %ige Ammoniaklösung; 90:10:0.1): R_f = 0.26; FD-MS: (M + 1)⁺ = 357

25 Beispiel 93: (2R*,4S*)-2-(3,4-Dichlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Die Titelverbindung der Formel



kann in analoger Weise wie in Beispiel 8 ausgehend von (2R*,4S*)-2-(3,4-Dichlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin als Ausgangsstoff hergestellt werden: Smp. 121-124°; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %ige Ammoniaklösung; 90:9.5:0.5): R_f = 0.30; FD-MS: M⁺ = 531/533

Der Ausgangsstoff kann wie folgt hergestellt werden:

a) N-{5-(3,4-Dichlorphenyl)pent-1-ene-4-yl}-3,5-dimethylbenzamid

50 Die Titelverbindung wird in 93 %iger Ausbeute in analoger Weise wie in Beispiel 8a beschrieben erhalten; Smp. 155-157°; IR-Spektrum (KBr): 3230, 1625, 1595 cm⁻¹; TLC (Hexan/Essigsäureethylester; 2:1): R_f = 0.46

b) N-{5-(3,4-Dichlorphenyl)pent-1-ene-4-yl}-N-ethoxymethyl-3,5-dimethylbenzamid

55 Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 8b beschrieben erhalten; IR-Spektrum (Film): 1640, 1600 cm⁻¹; TLC (Hexan/Essigsäureethylester; 2:1): R_f = 0.58

c) (2R*,4S*)-N-Acetyl-2-(3,4-dichlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin


Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 8c beschrieben erhalten; IR-Spektrum (KBr): 3260, 1655, 1605, 1595, 1540 cm^{-1} (KBr); TLC (Dichlormethan/Methanol; 10:1); $R_f = 0.32$

d) (2R*,4S*)-2-(3,4-Dichlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin

Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 8d beschrieben erhalten; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung; 300:25:3); $R_f = 0.46$

Beispiel 94: (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin

Eine Suspension von 211 mg (0.60 mMol) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-phenyl-4-piperidinamin in 8 ml 6N Salzsäure wird unter Inertgas 16 Stunden auf 100° erhitzt, wobei sich der Ausgangsstoff vollständig auflöst. Man lässt auf Raumtemperatur abkühlen, neutralisiert mit Natriumcarbonatlösung und extrahiert mit Essigsäureethylester. Säulenchromatographie an Silicagel mit Dichlormethan/Methanol (95:5 bis 90:10) als Laufmittel ergibt 135 mg Amin, welches ohne weitere Reinigung mit 60 mg (0.38 mMol) Chinolin-4-carboxaldehyd in Toluol unter azeotroper Wasserentfernung weiterumgesetzt wird. Nach Abziehen des Lösungsmittels bleibt ein Öl zurück. Dieses wird in Ethanol aufgenommen und bei 0° mit 14 mg (0.38 mMol) Natriumborhydrid versetzt. Nach 1.5 Stunden wird das Reaktionsgemisch mit 1N Salzsäure behandelt, 1 Stunde bei 25° gerührt und schliesslich mit 10 % iger wässriger Natriumcarbonatlösung neutralisiert. Man schüttelt mit Essigsäureethylester aus, trennt die organische Phase ab, trocknet über Natriumsulfat und dampft unter vermindertem Druck zur Trockne ein. Die Titelverbindung der Formel



wird durch Säulenchromatographie an Silicagel mit Dichlormethan/Isopropanol (9:1) als Laufmittel isoliert; TLC (Dichlormethan/Isopropanol; 9:1); $R_f = 0.51$; FD-MS: $M^+ = 449$
Der Ausgangsstoff kann wie folgt hergestellt werden:

a) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-benzyloxycarbonyl-2-phenyl-4-piperidinamin

Zu einer Lösung von 2.03 g (9.90 mMol) N-But-3-en-1-yl-O-benzylcarboxamid und 1.14 g (10.7 mMol) Benzaldehyd in 1 ml (810.6 mMol) Acetanhydrid und 20 ml Acetonitril werden bei -20° 1.41 ml (12.0 mMol) Zinntetrachlorid zugegeben. Man hält 16 Stunden bei -20°, behandelt dann mit 10 %-iger wässriger Natriumhydrogencarbonatlösung und extrahiert mit Essigsäureethylester. Die organische Phase wird über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Die rohe Titelverbindung wird aus Essigester/Hexan kristallisiert; Smp. 139-140°; CI-MS: $(M+H)^+ = 353$, $(M+NH_4)^+ = 370$.


b) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-phenyl-4-piperidinamin

Eine Lösung von 496 mg (1.41 mMol) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-benzyloxycarbonyl-2-phenyl-4-piperidinamin in 30 ml Ethanol und 8 ml 1N Salzsäure wird mit 50 mg 10 %-ige Pd/C-Katalysator versetzt und unter einer Wasserstoffatmosphäre gerührt, bis kein Wasserstoff mehr aufgenommen wird. Der Katalysator wird über Diatomeenerde abfiltriert und das Filtrat unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wird in 5 ml Dichlormethan und 5 ml 10 %-iger wässriger Natriumhydrogencarbonatlösung aufgenommen und unter Rühren bei 0° innerhalb von 1 Stunde langsam mit 285 mg (1.69 mMol) 3,5-Dimethylbenzoylchlorid versetzt. Das Reaktionsgemisch wird mit Dichlormethan extrahiert. Die organische

Phase wird abgetrennt, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck zur Trockne eingedampft. Die Titelverbindung kristallisiert aus Essigsäureethylester; Smp. 201-203 °; CI-MS: (M + H) + = 351.

Beispiel 95: (2R*,4S*)-1-(3,5-Dichlorbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinmethyl)-4-piperidinamin

Die Titelverbindung der Formel



kann in analoger Weise wie in Beispiel 10 beschrieben erhalten werden; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung; 90:9.5:0.5): R_f = 0.46; FD-MS: M^+ = 489.


Das Ausgangsmaterial kann wie folgt hergestellt werden:

a) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-2-phenyl-4-piperidinamin

Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 10b, ausgehend von 3,5-Dichlorbenzoylchlorid erhalten werden; Smp. 161-163 °; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung; 90:9.5:0.5): R_f = 0.55.

Beispiel 96: (2R*,4S*)-1-(1-Naphthoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinmethyl)-4-piperidinamin

Die Titelverbindung der Formel



wird in analoger Beispiel wie in Beispiel 11 beschrieben erhalten; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung, 90:9.5:0.5): R_f = 0.41; FD-MS: M^+ = 471

Das Ausgangsmaterial wird wie folgt erhalten:

a) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-(1-naphthoyl)-2-phenyl-4-piperidinamin

Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 10b beschrieben erhalten; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung, 90:9.5:0.5): R_f = 0.42.


Beispiel 97: (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1-naphthyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin

Die Titelverbindung der Formel

5

10

15



wird in analoger Weise wie in Beispiel 10 beschrieben erhalten; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung, 90:9.5:0.5): $R_f = 0.50$ FD-MS: $M^+ = 499$

20 Das Ausgangsmaterial wird wie folgt erhalten:

a) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-benzyloxycarbonyl-2-(1-naphthyl)-4-piperidinamin

Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 10a beschrieben, ausgehend von Naphthalin-25 1-carboxaldehyd statt Benzaldehyd erhalten; (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung, 90:9.5:0.5): $R_f = 0.31$ FD-MS: $M^+ = 402$.

b) (2R*,4S*)-N-Acetyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1-naphthyl)-4-piperidinamin

30 Die Titelverbindung wird in analoger Weise wie in Beispiel 10b beschrieben erhalten; TLC (Dichlormethan/Methanol/25 %-ige Ammoniaklösung, 90:9.5:0.5): $R_f = 0.26$ FD-MS: $M^+ = 400$.

Beispiel 98:

35 In analoger Weise wie in den Beispielen 85 bis 97 beschrieben kann man auch die folgenden Verbindungen herstellen:

- (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-naphthyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-methoxyphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(3-methoxyphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 40 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-trifluormethylphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethenyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 45 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-naphthyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-methoxybenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(3-methoxybenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 50 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-trifluormethylbenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorbenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethenyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 55 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(benzoylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-chlorbenzoylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin.

Beispiel 99:

Tabletten, enthaltend je 50 mg (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinaminoder ein Salz, z.B. das Hydrochlorid, davon können wie folgt hergestellt werden:

Zusammensetzung (10000 Tabletten)

Wirkstoff	500,0 g
Lactose	500,0 g
Kartoffelstärke	352,0 g
Gelatine	8,0 g
Talk	60,0 g
Magnesiumstearat	10,0 g
Siliciumdioxid (hochdispers)	20,0 g
Ethanol	q.s.

Der Wirkstoff wird mit der Lactose und 292 g Kartoffelstärke vermischt, die Mischung mit einer ethanolischen Lösung der Gelatine befeuchtet und durch ein Sieb granuliert. Nach dem Trocknen mischt man den Rest der Kartoffelstärke, das Magnesiumstearat, das Talk und das Siliciumdioxid zu und presst das Gemisch zu Tabletten von je 145,0 mg Gewicht und 50,0 mg Wirkstoffgehalt, die gewünschtenfalls mit Teilerkerben zur feineren Anpassung der Dosierung versehen sein können.

Beispiel 100:

Lacktabletten, enthaltend je 100 mg (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz, z.B. das Hydrochlorid, davon können wie folgt hergestellt werden:

Zusammensetzung (für 1000 Lacktabletten)

Wirkstoff	100,0 g
Lactose	100,0 g
Maisstärke	70,0 g
Talk	8,5 g
Calciumstearat	1,5 g
Hydroxypropylmethylcellulose	2,36 g
Schellack	0,64 g
Wasser	q.s.
Methylenchlorid	q.s.

Der Wirkstoff, die Lactose und 40 g der Maisstärke werden gemischt und mit einem Kleister, hergestellt aus 15 g Maisstärke und Wasser (unter Erwärmen), befeuchtet und granuliert. Das Granulat wird getrocknet, der Rest der Maisstärke, der Talk und das Calciumstearat zugegeben und mit dem Granulat vermischt. Das Gemisch wird zu Tabletten (Gewicht: 280 mg) verpresst und diese mit einer Lösung der Hydroxypropylmethylcellulose und des Schellacks in Methylenchlorid lackiert; Endgewicht der Lacktablette: 283 mg.

Beispiel 101:

Gelatinesteckcapseln, enthaltend 100 mg Wirkstoff, z.B. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinaminoder ein Salz, z.B. das Hydrochlorid, davon, können z.B. folgendermassen hergestellt werden:

Zusammensetzung (für 1000 Kapseln)

Wirkstoff	100,0 g
Lactose	250,0 g
mikrokristalline Zellulose	30,0 g
Natriumlaurylsulfat	2,0 g
Magnesiumstearat	8,0 g

Das Natriumlaurylsulfat wird durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,2 mm zu dem lyophilisierten Wirkstoff hinzugesiebt. Beide Komponenten werden innig vermischt. Dann wird zunächst die Lactose durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,6 mm und dann die mikrokristalline Zellulose durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,9 mm hinzugesiebt. Daraufhin wird erneut 10 Minuten innig gemischt. Zuletzt wird das Magnesiumstearat durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,8 mm hinzugesiebt. Nach 3-minütigem weiteren Mischen werden je 390 mg der erhaltenen Formulierung in Gelatinesteckkapseln der Grösse 0 abgefüllt.


Beispiel 102:

In analoger Weise wie in den vorstehenden Beispielen 99 bis 101 beschrieben kann man auch pharmazeutische Präparate, enthaltend eine andere Verbindung der Formel I gemäss einem der vorhergehenden Herstellungsbeispiele herstellen.

Patentansprüche

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE

1. Eine 1-Acylpiperidinverbindung der Formel I



worin R₁ unsubstituiertes oder im Phenylteil durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl- oder Diphenyl-C₁-C₄-alkyl, unsubstituiertes oder im Phenyl durch Halogen und/oder Triazolyl substituiertes Phenoxy-C₁-C₄-alkyl, Pyridyl- oder Chinoliny-C₁-C₄-alkyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Benzoyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Naphthoyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Pyridylcarbonyl oder Chinoliny carbonyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes 5-bis 7-gliedriges Cycloalkylcarbonyl, unsubstituiertes oder im Phenyl durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl- oder Diphenyl-C₁-C₄-alkanoyl, unsubstituiertes oder im Phenylteil gegebenenfalls im Phenyl durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes N-Phenylcarbamoyl oder eine Gruppe der Formel Ia



darstellt, in der R₅ Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Mercapto, Amino, gegebenenfalls

durch Hydroxy substituiertes Phenyl, Carboxy, Carbamoyl oder Ureido substituiertes C₁-C₄-Alkyl und R₆ C₂-C₇-Alkanoyl bedeutet, R₂ 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl oder einen unsubstituierten oder durch aromatisch gebundenes C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituierten Phenyl-, Naphthyl- oder Pyridylrest darstellt, R₃ für Wasserstoff, C₁-C₇-Alkyl, Carbamoyl, C₂-C₇-Alkanoyl, Carboxy-C₁-C₄-alkanoyl oder Carboxy-C₂-C₄-alkenoyl steht, R₄ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl oder Naphthyl oder unsubstituiertes Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, 2,3-Dihydroindolyl, Benzimidazolyl, Chinolyl oder 1,2,3,4-Tetrahydrochinolyl bedeutet, X₁ Methylen, Hydroxymethylen, C₁-C₄-Alkoxymethylen, Carbonyl oder Di-C₁-C₄-alkoxymethylen oder eine direkte Bindung darstellt, X₂ für C₁-C₇-Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung steht und X₃ Carbonyl, C₁-C₄-Alkylen, Carboxy-C₁-C₄-alkylen, C₁-C₄-Alkoxycarbonyl-C₁-C₄-alkylen, Carbamoyl-C₁-C₄-alkylen oder Hydroxymethyl-C₁-C₄-alkylen darstellt, oder ein Salz davon. Niederalkyl ist C₁-C₇-Alkyl.

2. Eine Verbindung gemäss Anspruch 1 der Formel I, worin R₁ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Benzoyl, Naphthoyl oder Phenyl-C₁-C₄-alkanoyl, unsubstituiertes Pyridylcarbonyl oder Chinolylcarbonyl oder eine Gruppe der Formel Ia



darstellt, in der R₅ Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Mercapto, Amino, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Phenyl, Carboxy, Carbamoyl oder Ureido substituiertes C₁-C₄-Alkyl und R₆ C₂-C₇-Alkanoyl bedeutet, R₂ 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl oder einen unsubstituierten oder durch aromatisch gebundenes C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituierten Phenyl-, Naphthyl- oder Pyridylrest darstellt, R₃ für Wasserstoff, C₁-C₇-Alkyl, Carbamoyl, C₂-C₇-Alkanoyl, Carboxy-C₁-C₄-alkanoyl oder Carboxy-C₃-C₅-alkenoyl steht, R₄ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl oder Naphthyl oder unsubstituiertes Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, Benzimidazolyl oder Chinolyl bedeutet, X₁ Methylen, Hydroxymethylen, C₁-C₄-Alkoxymethylen, Carbonyl, Di-C₁-C₄-alkoxymethylen oder eine direkte Bindung darstellt, X₂ für C₁-C₇-Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung steht und X₃ Carbonyl, C₁-C₄-Alkylen, Carboxy-C₁-C₄-alkylen, C₁-C₄-Alkoxycarbonyl-C₁-C₄-alkylen, Carbamoyl-C₁-C₄-alkylen, oder Hydroxymethyl-C₁-C₄-alkylen darstellt, oder ein Salz davon.

3. Eine Verbindung gemäss Anspruch 1 der Formel I, worin R₁ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl oder Phenyl-C₁-C₄-alkanoyl bedeutet, R₂ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl oder unsubstituiertes Pyridyl darstellt, R₃ für Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, Carbamoyl oder C₂-C₇-Alkanoyl, steht, R₄ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl oder unsubstituiertes Naphthyl, Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, Benzimidazolyl oder Chinolyl bedeutet, X₁ Methylen, Hydroxymethylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung darstellt, X₂ für eine direkte Bindung steht und X₃ C₁-C₄-Alkylen, darstellt, oder ein Salz davon.

4. Eine Verbindung gemäss Anspruch 1 der Formel I, worin R₁ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl bedeutet, R₂ unsubstituiertes oder durch Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl darstellt, R₃ für Wasserstoff steht, R₄ unsubstituiertes Chinolyl bedeutet, X₁ Methylen darstellt, X₂ für eine direkte Bindung steht und X₃ C₁-C₄-Alkylen darstellt, oder ein Salz davon.

5. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.

6. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-trifluormethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.

7. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
8. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 5 9. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(1-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
10. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 10 11. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chinolinyldicarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
12. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlor-phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
13. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 15 14. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
15. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphtylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 20 16. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chinolylmethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
17. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorbenzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
18. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,2-diphenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 25 19. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
20. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(diphenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 30 21. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
22. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
23. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,3-diphenylpropionyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 35 24. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
25. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 40 26. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-N,N-dimethylaminobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
27. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(cis,cis-3,5-dimethylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 45 28. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 50 29. (2S*,4R*)-2-Benzyl-1-[2-(5-chlor-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenoxyethyl]-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
30. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 55 31. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
32. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.


33. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
34. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin
oder ein Salz davon.
35. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamido-butyryl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin
oder ein Salz davon.
36. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-benzoyl-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
37. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
38. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-(3-carboxamido-propionyl)-4-
piperidinamin oder ein Salz davon.
39. (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein
Salz davon.
40. (2S,4R) und (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz
davon.
41. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
42. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
43. (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
44. (2S,4R)- oder (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
45. (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-pyridylmethyl)-4-piperidinamin oder ein
Salz davon.
46. (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-pyridylmethyl)-4-piperidinamin oder ein
Salz davon.
47. (2S,4R)- und (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein
Salz davon.
48. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-N-carbamoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
49. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-methoxyphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-methoxyphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluormethylphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-trifluormethylbenzyl)-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(3-trifluormethylphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;

[illegible]

- (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 5 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chlorbenzyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;
 10 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorphenyl)propyl]-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethylenedioxybenzyl)-4-piperidinamin oder
 15 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethylenedioxybenzyl)-4-piperidinamin oder jeweils ein Salz davon.
50. (2R,4S) und (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 20 51. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
52. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 25 53. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
54. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 30 55. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,6-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
56. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dibrombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
57. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 35 58. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
59. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-brombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 40 60. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
61. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-cyanbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
62. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 45 63. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
64. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-methyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 50 65. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-cyclohexylcarbamoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
66. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 55 67. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.

68. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
69. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-naphthoyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 5 70. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
71. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 10 72. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-indolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
73. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-indolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
74. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(5-methoxy-2-indolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 15 75. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(1-naphthoyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
76. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(phenylacetyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 20 77. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
78. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-(N-acetyl)-indolyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 25 79. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-benzo[b]furanyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
80. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-[(3-methylbenzo[b]thiophen-2-ylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 30 81. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(5-methoxyindol-3-ylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
82. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-indolyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 35 83. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
84. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-diphenyldimethyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 40 85. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
86. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 45 87. (2R*,4S*,1'R*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
88. (2R*,4S*,1'R*)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyldimethyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 50 89. (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyldimethyl)-N-(4-chinolyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
- 55 90. (2R*,4S*,1'R*)-2-{1'-Hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)dimethyl}-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.


91. (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)-methyl}-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
92. (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
93. (2R*,4S*,)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
94. (2R*,4S*)-2-(4-Chlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
95. (2R*,4S*)-2-(3,4-Dichlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
96. (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
97. (2R*,4S*)-1-(3,5-Dichlorbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
98. (2R*,4S*)-1-(1-Naphthoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidineamin
99. (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1-naphthyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon.
100. Ein neues 1-Acylpiperidon der Formel X




worin R₁ einen gegebenenfalls substituierten Aryl-, Heteroaroyl-, Cycloalkylcarbonyl-, Alkanoyl-, Heteroarylalkanoyl-, Alkoxyalkyl-, Arylcarbonyl- oder den Acylrest einer gegebenenfalls durch Niederalkanoyl oder Carbonylniederalkanoyl N-substituierten α-Aminosäure bedeutet, R₂ Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten Aryl- oder Heteroarylrest darstellt, X₁ Hydroxymethylen darstellt und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, oder ein Salz davon.

101. Eine Verbindung gemäss Anspruch 100 der Formel X, worin R₁ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl bedeutet, R₂ unsubstituiertes oder durch Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl darstellt, X₁ Hydroxymethylen darstellt, und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, oder ein Salz davon.
102. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidon oder ein Salz davon.
103. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluormethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
104. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
105. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Bistrifluormethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
106. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluormethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.

107. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
108. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
109. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
110. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
111. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
112. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
113. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
114. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)-methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon.
115. Verbindungen gemäss einem der Ansprüche 1 bis 114 zur Anwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.
116. Pharmazeutische Präparate, neben üblichen pharmazeutischen Hilfsstoffen als pharmazeutischen Wirkstoff enthaltend eine Verbindung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 47 in freier Form oder in pharmazeutisch verwendbarer Salzform.
117. Pharmazeutische Präparate, neben üblichen pharmazeutischen Hilfsstoffen als pharmazeutischen Wirkstoff enthaltend eine Verbindung gemäss einem der Ansprüche 48 bis 115 in freier Form oder in pharmazeutisch verwendbarer Salzform.
118. Verfahren zur Herstellung neuer 1-Acylpiperidinverbindungen gemäss Anspruch 1 und ihrer Salze, dadurch gekennzeichnet, dass man
a) in eine Verbindung der Formel II




worin R₂, R₃, R₄, X₁, X₂ und X₃ die angegebenen Bedeutungen haben, den Rest R₁ einführt oder
b) Verbindungen der Formeln III und IV




worin Y₁ eine Gruppe der Formel -N(R₃)-H und Y₂ Hydroxy, reaktionsfähiges verestertes Hydroxy

oder, sofern X_3 für Carbonyl steht, verethertes Hydroxy darstellt oder Y_1 Hydroxy, reaktionsfähig verestertes Hydroxy oder, sofern X_2 Carbonyl bedeutet, verethertes Hydroxy und Y_2 eine Gruppe der Formel $-N(R_3)-H$ darstellt, wobei R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder deren Salze miteinander kondensiert oder

c) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin einer der Reste X_2 und X_3 Alkylen und der andere Alkylen, Carbonyl oder im Falle von X_2 eine direkte Bindung bzw. im Falle von X_3 einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest darstellt, in einer Verbindung der Formel V




worin Z_1 einen in α -Stellung zur Gruppe $-N(R_3)-$ durch Oxo oder Hydroxy substituierten Alkylenrest und Z_2 Alkylen, Carbonyl oder einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest bedeutet oder Z_1 Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung und Z_2 in α -Stellung zur Gruppe $-N(R_3)-$ durch Oxo oder Hydroxy substituierten Alkylenrest darstellt und R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder in einem Salz davon die Oxo- bzw. Hydroxygruppe in α -Stellung zur Gruppe $-N(R_3)-$ reduktiv durch Wasserstoff ersetzt bzw. in einer Verbindung der Formel VI




worin Z_3 einen Rest der Formel $-C(R_a)=C(R_b)-$ und Z_4 Alkylen, Carbonyl oder einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest bedeutet oder Z_3 Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung und Z_4 einen Rest der Formel $-C(R_a)=C(R_b)-$ bedeutet, wobei R_a und R_b jeweils Wasserstoff oder Niederalkyl bedeuten, den Rest der Formel $-C(R_a)=C(R_b)-$ durch Reduktion der Doppelbindung zu dem entsprechenden Rest $-CH(R_a)-CH(R_b)-$ reduziert oder

d) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin X_1 eine Carbonyl- oder Hydroxymethylen-Gruppe bedeutet, Verbindungen der Formeln VII und VIII




worin einer der Reste Y_3 und Y_4 Formyl oder eine gegebenenfalls anhydridisierte oder veresterte Carboxygruppe und der andere einen metallischen Rest darstellt und R_2 , R_3 , R_4 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, miteinander kondensiert oder

e) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin R_3 für Wasserstoff steht, aus einer Verbindung der Formel IX




worin Y_5 eine Aminoschutzgruppe bedeutet und R_2 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder aus einem Salz davon die Gruppe Y_5 abspaltet oder

f) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin X_3 Alkylen bedeutet, Verbindungen der Formeln X und XI



worin Y_6 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$, Y_7 Wasserstoff, Y_8 und Y_9 gemeinsam Oxo und Z_5 einen X_3 entsprechenden Alkanylylidenrest bedeuten oder Y_6 und Y_7 gemeinsam Oxo, Y_8 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$, Y_9 Wasserstoff und Z_5 einen Rest X_3 darstellt, unter reduzierenden Bedingungen miteinander kondensiert und gewünschtenfalls eine erhaltene Verbindung in eine andere Verbindung der Formel I überführt, ein verfahrensgemäss erhältliches Isomerengemisch in die Komponenten auftrennt und das jeweils bevorzugte Isomere abtrennt und/oder eine verfahrensgemäss erhältliche freie Verbindung in ein Salz oder eine verfahrensgemäss erhältliche Salz in die entsprechende freie Verbindung überführt.

119. Verfahren zur Herstellung neuer 1-Acylpiperidone gemäss Anspruch 100 und ihrer Salze, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel Xa




mit einem den Rest R_1 einführendem Mittel kondensiert und gewünschtenfalls eine erhaltene Verbindung in eine andere Verbindung der Formel I überführt, ein verfahrensgemäss erhältliches Isomerengemisch in die Komponenten auftrennt und das jeweils bevorzugte Isomere abtrennt und/oder eine verfahrensgemäss erhältliche freie Verbindung in ein Salz oder eine verfahrensgemäss erhältliche Salz in die entsprechende freie Verbindung überführt.

120. Verwendung einer Verbindung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 115 für die Herstellung eines für die Behandlung von Erkrankungen, bei deren Entstehung Substanz P eine wesentliche Rolle spielt, bestimmten Arzneimittels.

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten : ES, GR

1. Verfahren zur Herstellung neuer 1-Acylpiperidinverbindungen der Formel I




worin R_1 unsubstituiertes oder im Phenylteil durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl- oder Diphenyl- C_1 - C_4 -alkyl, unsubstituiertes oder im Phenyl durch Halogen und/oder Triazolyl substituiertes Phenoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Pyridyl- oder Chinoliny- C_1 - C_4 -alkyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Benzoyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Naphthoyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Pyridylcarbonyl oder Chinoliny- C_1 - C_4 -alkyl, unsubstituiertes oder durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes 5-bis 7-gliedriges Cycloalkylcarbonyl, unsubstituiertes oder im Phenyl durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl- oder Diphenyl- C_1 - C_4 -alkanoyl, w unsubstituiertes oder im Phenylteil gegebenenfalls durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Diniederalkylamino, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes N-Phenylcarbamoyl oder eine Gruppe der Formel Ia



darstellt, in der R_5 Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Mercapto, Amino, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Phenyl, Carboxy, Carbamoyl oder Ureido substituiertes C_1 - C_4 -Alkyl und R_6 C_2 - C_7 -Alkanoyl bedeutet, R_2 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl oder einen unsubstituierten oder durch aromatisch gebundenes C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituierten Phenyl-, Naphthyl- oder Pyridylrest darstellt, R_3 für Wasserstoff, C_1 - C_7 -Alkyl, Carbamoyl, C_2 - C_7 -Alkanoyl, Carboxy- C_1 - C_4 -alkanoyl oder Carboxy- C_2 - C_4 -alkenoyl steht, R_4 unsubstituiertes oder durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl oder Naphthyl oder unsubstituiertes Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, 2,3-Dihydroindolyl, Benzimidazolyl, Chinolyl oder 1,2,3,4-Tetrahydrochinolyl bedeutet, X_1 Methylen, Hydroxymethylen, C_1 - C_4 -Alkoxymethylen, Carbonyl, Di- C_1 - C_4 -alkoxymethylen oder eine direkte Bindung darstellt, X_2 für C_1 - C_7 -Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung steht und X_3 Carbonyl, C_1 - C_4 -Alkylen, Carboxy- C_1 - C_4 -alkylen, C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonyl- C_1 - C_4 -alkylen, Carbamoyl- C_1 - C_4 -alkylen oder Hydroxymethyl- C_1 - C_4 -alkylen darstellt, Niederalkyl ist C_1 - C_7 -Alkyl und ihrer Salze, dadurch gekennzeichnet, dass man


a) in eine Verbindung der Formel II



worin R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, den Rest R_1 einführt oder


b) Verbindungen der Formeln III und IV

5



10

und




15

worin Y_1 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$ und Y_2 Hydroxy, reaktionsfähiges verestertes Hydroxy oder, sofern X_3 für Carbonyl steht, verethertes Hydroxy darstellt oder Y_1 Hydroxy, reaktionsfähig verestertes Hydroxy oder, sofern X_2 Carbonyl bedeutet, verethertes Hydroxy und Y_2 eine Gruppe der Formel $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$ darstellt, wobei R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder deren Salze miteinander kondensiert oder

20

c) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin einer der Reste X_2 und X_3 Alkylen und der andere Alkylen, Carbonyl oder im Falle von X_2 eine direkte Bindung bzw. im Falle von X_3 einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest darstellt, in einer Verbindung der Formel V


25



30

worin Z_1 einen in α -Stellung zur Gruppe $-\text{N}(\text{R}_3)-$ durch Oxo oder Hydroxy substituierten Alkylenrest und Z_2 Alkylen, Carbonyl oder einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest bedeutet oder Z_1 Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung und Z_2 in α -Stellung zur Gruppe $-\text{N}(\text{R}_3)-$ durch Oxo oder Hydroxy substituierten Alkylenrest darstellt und R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 und X_3 die angegebenen Bedeutungen haben, oder in einem Salz davon die Oxo- bzw. Hydroxygruppe in α -Stellung zur Gruppe $-\text{N}(\text{R}_3)-$ reduktiv durch Wasserstoff ersetzt bzw. in einer Verbindung der Formel VI

40




45

worin Z_3 einen Rest der Formel $-\text{C}(\text{R}_a)=\text{C}(\text{R}_b)-$ und Z_4 Alkylen, Carbonyl oder einen gegebenenfalls durch Hydroxymethyl oder gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy substituiertes Alkylenrest bedeutet oder Z_3 Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung und Z_4 einen Rest der Formel $-\text{C}(\text{R}_a)=\text{C}(\text{R}_b)-$ bedeutet, wobei R_a und R_b jeweils Wasserstoff oder Niederalkyl bedeuten, den Rest der Formel $-\text{C}(\text{R}_a)=\text{C}(\text{R}_b)-$ durch Reduktion der Doppelbindung zu dem entsprechenden Rest $-\text{CH}(\text{R}_a)-\text{CH}(\text{R}_b)-$ reduziert oder

55

d) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin X_1 eine Carbonyl- oder Hydroxymethylen-Gruppe bedeutet, Verbindungen der Formeln VII und VIII




und

Y₄-R₂ (VIII),


worin einer der Reste Y₃ und Y₄ Formyl oder eine gegebenenfalls anhydridisierte oder veresterte Carboxygruppe und der andere einen metallischen Rest darstellt und R₂, R₃, R₄, X₂ und X₃ die angegebenen Bedeutungen haben, miteinander kondensiert oder

e) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin R₃ für Wasserstoff steht, aus einer Verbindung der Formel IX



worin Y₅ eine Aminoschutzgruppe bedeutet und R₂, R₄, X₁, X₂ und X₃ die angegebenen Bedeutungen haben, oder aus einem Salz davon die Gruppe Y₅ abspaltet oder

f) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, worin X₃ Alkylen bedeutet, Verbindungen der Formeln X und XI



worin Y₆ eine Gruppe der Formel -N(R₃)-H, Y₇ Wasserstoff, Y₈ und Y₉ gemeinsam Oxo und Z₅ einen X₃ entsprechenden Alkanylylidenrest bedeuten oder Y₆ und Y₇ gemeinsam Oxo, Y₈ eine Gruppe der Formel -N(R₃)-H, Y₉ Wasserstoff und Z₅ einen Rest X₃ darstellt, unter reduzierenden Bedingungen miteinander kondensiert und gewünschtenfalls eine erhaltene Verbindung in eine andere Verbindung der Formel I überführt, ein verfahrensgemäss erhältliches Isomerengemisch in die Komponenten auftrennt und das jeweils bevorzugte Isomere abtrennt und/oder eine verfahrensgemäss erhältliche freie Verbindung in ein Salz oder eine verfahrensgemäss erhältliche Salz in die entsprechende freie Verbindung überführt.

2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel I, worin R₁ unsubstituiertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Benzoyl, Naphthoyl oder Phenyl-C₁-C₄-alkanoyl, unsubstituiertes Pyridylcarbonyl oder Chinoliny carbonyl oder eine Gruppe der Formel Ia



darstellt, in der R_5 Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Mercapto, Amino, gegebenenfalls durch Hydroxy substituiertes Phenyl, Carboxy, Carbamoyl oder Ureido substituiertes C_1 - C_4 -Alkyl und R_6 C_2 - C_7 -Alkanoyl bedeutet, R_2 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl oder einen unsubstituierten oder durch aromatisch gebundenes C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituierten Phenyl-, Naphthyl- oder Pyridylrest darstellt, R_3 für Wasserstoff, C_1 - C_7 -Alkyl, Carbamoyl, C_2 - C_7 -Alkanoyl, Carboxy- C_1 - C_4 -alkanoyl oder Carboxy- C_3 - C_5 -alkenoyl steht, R_4 unsubstituiertes oder durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen und/oder Trifluormethyl substituiertes Phenyl oder Naphthyl oder unsubstituiertes Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, Benzimidazolyl oder Chinolyl bedeutet, X_1 Methylen, Hydroxymethylen, C_1 - C_4 -Alkoxymethylen, Carbonyl, Di- C_1 - C_4 -alkoxymethylen oder eine direkte Bindung darstellt, X_2 für C_1 - C_7 -Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung steht und X_3 Carbonyl, C_1 - C_4 -Alkylen, Carboxy- C_1 - C_4 -alkylen, C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonyl- C_1 - C_4 -alkylen, Carbamoyl- C_1 - C_4 -alkylen, oder Hydroxymethyl- C_1 - C_4 -alkylen darstellt, oder ein Salz davon herstellt.

3. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel I, worin R_1 unsubstituiertes oder durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl oder Phenyl- C_1 - C_4 -alkanoyl bedeutet, R_2 unsubstituiertes oder durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl oder unsubstituiertes Pyridyl darstellt, R_3 für Wasserstoff, C_1 - C_4 -Alkyl, Carbamoyl oder C_2 - C_7 -Alkanoyl, steht, R_4 unsubstituiertes oder durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl oder unsubstituiertes Naphthyl, Pyridyl, Benzofuranyl, Indolyl, Benzimidazolyl oder Chinolyl bedeutet, X_1 Methylen, Hydroxymethylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung darstellt, X_2 für eine direkte Bindung steht und X_3 C_1 - C_4 -Alkylen, darstellt, oder ein Salz davon herstellt.

4. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel I, worin R_1 unsubstituiertes oder durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl bedeutet, R_2 unsubstituiertes oder durch Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Phenyl darstellt, R_3 für Wasserstoff steht, R_4 unsubstituiertes Chinolyl bedeutet, X_1 Methylen darstellt, X_2 für eine direkte Bindung steht und X_3 C_1 - C_4 -Alkylen darstellt, oder ein Salz davon herstellt.

5. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

6. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-trifluormethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

7. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

8. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

9. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(1-naphthoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

10. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

11. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chinolyl-carbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

12. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlor-phenyl-lacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

13. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
14. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
15. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphtylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
16. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chinolylmethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
17. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorbenzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
18. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,2-diphenylethyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
19. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylcarbamoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
20. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(diphenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
21. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
22. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-pyridylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
23. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,3-diphenylpropionyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
24. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
25. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
26. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-N,N-dimethylaminobenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
27. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(cis,cis-3,5-dimethylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
28. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
29. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2S*,4R*)-2-Benzyl-1-[2-(5-chlor-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenoxyethyl]-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
30. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
31. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

32. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
33. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
34. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamido-but yroyl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
35. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamido-but yroyl)-phenylalanyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
36. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-benzoyl-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
37. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
38. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-(3-carboxamido-propionyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
39. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
40. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2S,4R) und (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
41. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
42. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
43. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
44. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2S,4R)- oder (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
45. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-pyridylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
46. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)- oder (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-pyridylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
47. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2S,4R) und (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
48. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-N-carbamoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
49. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin;
(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin;
(2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamin;

[illegible]

[illegible]

(2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethyldioxybenzyl)-4-piperidinamin oder
 (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethyldioxybenzyl)-4-piperidinamin oder jeweils ein Salz davon herstellt.

5

50. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S) und (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

10

51. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

52. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

15

53. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

54. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylacetyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

20

55. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,6-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

25

56. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dibrombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

57. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

30

58. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

59. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-brombenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

35

60. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

40

61. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-cyanbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

62. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

45

63. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

64. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-methyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

50

65. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-cyclohexylcarbamoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

55

66. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolylmethyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.


67. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.

68. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis-(trifluormethyl)-benzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
69. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-naphthoyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
70. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
71. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(4-chinolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
72. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-indolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
73. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-indolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
74. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(5-methoxy-2-indolyldicarbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
75. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(1-naphthoyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
76. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(phenylacetyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
77. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
78. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-(N-acetyl)-indolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
79. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(2-benzo[b]furanylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
80. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-[(3-methylbenzo[b]thiophen-2-ylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
81. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(5-methoxyindol-3-ylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
82. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3-indolylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
83. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-phenylcarbonyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
84. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-diphenylmethyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
85. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorbenzoyl)-N-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
86. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-N-(4-chinolyldimethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.


87. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*,1'R*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
88. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*,1'R*)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
89. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
90. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*,1'R*)-2-{1'-Hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
91. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
92. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
93. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
94. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-(4-Chlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
95. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-2-(3,4-Dichlorbenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
96. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
97. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-1-(3,5-Dichlorbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
98. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-1-(1-Naphthoyl)-2-phenyl-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidineamin
99. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1-naphthyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder ein Salz davon herstellt.
100. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-naphthyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-methoxyphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(3-methoxyphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-trifluormethylphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorphenylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethenyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-chlorbenzoyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-naphthyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-methoxybenzyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;

(2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(3-methoxybenzyl)-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-trifluormethylbenzyl)-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorbenzyl)-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 5 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethyl)-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethenyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(benzoylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder
 (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(4-chlorbenzoylmethyl)-N-(4-chinolinylmethyl)-4-piperidinamin oder
 jeweils ein Salz davon herstellt.

101. Verfahren zur Herstellung neuer 1-Acylpiperidone der Formel X



20 worin R₁ einen gegebenenfalls substituierten Aroyl-, Heteroaroyl-, Cycloalkylcarbonyl-, Aralkanoyl-,
 Heteroaralkanol-, Aralkoxycarbonyl- oder Arylcarbamoylrest oder den Acylrest einer gegebenenfalls
 durch Niederalkanoyl oder Carbamoylniederalkanoyl N-substituierten α-Aminosäure bedeutet, R₂ Cyclo-
 alkyl oder einen gegebenenfalls substituierten Aryl- oder Heteroaroylrest darstellt, X₁ Hydroxymethylen
 25 darstellt und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, und ihrer Salze, dadurch gekennzeichnet, dass
 man eine Verbindung der Formel Xa



35 mit einem den Rest R₁ einführendem Mittel kondensiert und gewünschtenfalls eine erhaltene Verbin-
 dung in eine andere Verbindung der Formel I überführt, ein verfahrensgemäss erhältliches Isomerenge-
 misch in die Komponenten auftrennt und das jeweils bevorzugte Isomere abtrennt und/oder eine
 verfahrensgemäss erhältliche freie Verbindung in ein Salz oder eine verfahrensgemäss erhältliches
 40 Salz in die entsprechende freie Verbindung überführt.

102. Verfahren gemäss Anspruch 101 zur Herstellung von Verbindungen der Formel X, worin R₁ unsubstitu-
 iertes oder durch C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, Halogen der Atomnummer bis und mit 35, und/oder
 Trifluormethyl mono- oder disubstituiertes Benzoyl oder unsubstituiertes Naphthoyl bedeutet, R₂
 unsubstituiertes oder durch Halogen der Atomnummer bis und mit 35 und/oder Trifluormethyl mono-
 45 oder disubstituiertes Phenyl darstellt X₁ Hydroxymethylen darstellt, und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo
 stehen, und ihrer Salze.


103. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylben-
 zoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.

104. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluormethyl-
 benzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.

105. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylben-
 zoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.

106. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'S*)-1-(3,5-Bistrifluormethyl-
 benzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.

107. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluormethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
108. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
109. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
110. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
111. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
112. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
113. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
114. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
115. Verfahren gemäss Anspruch 101, dadurch gekennzeichnet, dass man (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)methyl}-4-piperidon oder ein Salz davon herstellt.
116. Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutischen Präparates, dadurch gekennzeichnet, dass man eine 1-Acylpiperidinverbindung der Formel I oder X




worin R₁ in Formel I einen gegebenenfalls substituierten Aralkyl-, Aryloxyalkyl-, Heteroaralkyl-, Aroyl-, Heteroaroyl-, Cycloalkylcarbonyl-, Alkanoyl-, Heteroarylalkanoyl-, Aralkoxycarbonyl- oder Arylcarbamoylrest oder den Acylrest einer gegebenenfalls durch Niederalkanoyl oder Carbamoylniederalkanoyl N-substituierten α-Aminosäure bedeutet, R₂ Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten Aryl- oder Heteroarylrest darstellt bzw. in Formel X einen gegebenenfalls substituierten Aroyl-, Heteroaroyl-, Cycloalkylcarbonyl-, Alkanoyl-, Heteroarylalkanoyl-, Aralkoxycarbonyl- oder Arylcarbamoylrest oder den Acylrest einer gegebenenfalls durch Niederalkanoyl oder Carbamoylniederalkanoyl N-substituierten α-Aminosäure, R₃ für Wasserstoff, Alkyl, Carbamoyl oder einen gegebenenfalls durch Carboxy oder verestertes oder amidiertes Carboxy substituierten Alkanoyl- oder Alkenoylrest steht, R₄ einen gegebenenfalls substituierten Aryl- oder gegebenenfalls partiell hydrierten Heteroarylrest bedeutet, X₁ in Formel I Methylen, Ethylen, eine direkte Bindung, eine gegebenenfalls ketalisierte Carbonylgruppe oder eine gegebenenfalls veretherte Hydroxymethylengruppe bzw. in Formel X Hydroxymethylen darstellt, X₂ für Alkylen, Carbonyl oder eine direkte Bindung steht, X₃ Carbonyl, Oxoniederalkylen, Oxo(aza)-niederalkylen oder einen gegebenenfalls durch Phenyl, Hydroxymethyl, gegebenenfalls verestertes oder amidiertes Carboxy oder in höherer als der α-Stellung durch Hydroxy substituierten Alkylenrest darstellt und Y₆ und Y₇ gemeinsam für Oxo stehen, oder ein pharmazeutisch verwendbares Salz davon mit üblichen pharmazeutischen Hilfsstoffen vermischt.


Claims

Claims for the following Contracting States : AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE

1. A 1-acylpiperidine compound of the formula I



in which R₁ is phenyl- or diphenyl-C₁-C₄alkyl which is unsubstituted or substituted in the phenyl moiety by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, phenoxy-C₁-C₄alkyl which is unsubstituted or substituted in the phenyl by halogen and/or triazolyl, pyridyl- or quinoliny-C₁-C₄alkyl, benzoyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, naphthoyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, pyridylcarbonyl or quinoliny carbonyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, 5- to 7-membered cycloalkylcarbonyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, phenyl- or diphenyl-C₁-C₄alkanoyl which is unsubstituted or substituted in the phenyl by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, N-phenylcarbamoyl which is unsubstituted or optionally substituted in the phenyl moiety by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, or a group of the formula Ia



in which R₅ is hydrogen, C₁-C₄alkyl which is unsubstituted or substituted by hydroxyl, mercapto, amino, optionally hydroxy-substituted phenyl, carboxyl, carbamoyl or ureido, and R₆ is C₂-C₇alkanoyl, R₂ is 5- to 7-membered cycloalkyl or a phenyl, naphthyl or pyridyl radical which is unsubstituted or substituted by aromatically bonded C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, R₃ is hydrogen, C₁-C₇alkyl, carbamoyl, C₂-C₇alkanoyl, carboxy-C₁-C₄alkanoyl or carboxy-C₂-C₄alkenoyl, R₄ is phenyl or naphthyl which is unsubstituted or substituted by C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, or unsubstituted pyridyl, benzofuranyl, indolyl, 2,3-dihydroindolyl, benzimidazolyl, quinolyl or 1,2,3,4-tetrahydroquinolyl, X₁ is methylene, hydroxymethylene, C₁-C₄alkoxymethylene, carbonyl, di-C₁-C₄alkoxymethylene or a direct linkage, X₂ is C₁-C₇alkylene, carbonyl or a direct linkage, and X₃ is carbonyl, C₁-C₄alkylene, carboxy-C₁-C₄alkylene, C₁-C₄alkoxycarbonyl-C₁-C₄alkylene, carbamoyl-C₁-C₄alkylene or hydroxymethyl-C₁-C₄alkylene, or a salt thereof; lower alkyl is C₁-C₇alkyl.

2. A compound according to claim 1 of the formula I in which R₁ is benzoyl, naphthoyl or phenyl-C₁-C₄alkanoyl which is unsubstituted or substituted by C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, unsubstituted by pyridylcarbonyl or quinoliny carbonyl or a group of the formula Ia



in which R₅ is hydrogen, C₁-C₄alkyl which is unsubstituted or substituted by hydroxyl, mercapto, amino, optionally hydroxy-substituted phenyl, carboxyl, carbamoyl or ureido, and R₆ is C₂-C₇alkanoyl,

5 R_2 is 5- to 7-membered cycloalkyl or a phenyl, naphthyl or pyridyl radical which is unsubstituted or substituted by aromatically bonded C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, R_3 is hydrogen, C_1 - C_7 alkyl, carbamoyl, C_2 - C_7 alkanoyl, carboxy- C_1 - C_4 alkanoyl or carboxy- C_3 - C_5 alkenoyl, R_4 is phenyl or naphthyl which is unsubstituted or substituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, or unsubstituted pyridyl, benzofuranyl, indolyl, benzimidazolyl or quinolyl, X_1 is methylene, hydroxymethylene, C_1 - C_4 alkoxymethylene, carbonyl, di- C_1 - C_4 alkoxymethylene or a direct linkage, X_2 is C_1 - C_7 alkylene, carbonyl or a direct linkage, and X_3 is carbonyl, C_1 - C_4 alkylene, carboxy- C_1 - C_4 alkylene, C_1 - C_4 alkoxycarbonyl- C_1 - C_4 alkylene, carbamoyl- C_1 - C_4 alkylene or hydroxymethyl- C_1 - C_4 alkylene, or a salt thereof.

- 10 3. A compound according to claim 1 of the formula I in which R_1 is benzoyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthoyl or phenyl- C_1 - C_4 alkanoyl, R_2 is phenyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted pyridyl, R_3 is hydrogen, C_1 - C_4 alkyl, carbamoyl or C_2 - C_7 alkanoyl, R_4 is phenyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthyl, pyridyl, benzofuranyl, indolyl, benzimidazolyl or quinolyl, X_1 is methylene, hydroxymethylene, carbonyl or a direct linkage, X_2 is a direct linkage, and X_3 is C_1 - C_4 alkylene, or a salt thereof.
- 20 4. A compound according to claim 1 of the formula I in which R_1 is benzoyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthoyl, R_2 is phenyl or phenyl mono- or disubstituted by halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, R_3 is hydrogen, R_4 is unsubstituted quinolyl, X_1 is methylene, X_2 is a direct linkage and X_3 is C_1 - C_4 alkylene, or a salt thereof.
- 25 5. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 30 6. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-trifluoromethylbenzoyl)-N-(4-quinolyl-methyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
7. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 35 8. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
9. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(1-naphthoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
10. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 40 11. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-quinolylcarbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
12. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorophenylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 45 13. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
14. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-phenylethyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
15. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-naphthylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 50 16. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-quinolylmethyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
17. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorobenzyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 55 18. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,2-diphenylethyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
19. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylcarbamoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.

20. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(diphenylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
21. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-pyridylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 5 22. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-pyridylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
23. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,3-diphenylpropionyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
24. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-
10 4-piperidinamine or a salt thereof.
25. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-methoxybenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
26. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-N,N-dimethylaminobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt
15 thereof.
27. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(cis,cis-3,5-dimethylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a
salt thereof.
- 20 28. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt
thereof.
29. (2S*,4R*)-2-Benzyl-1-[2-(5-chloro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenoxyethyl]-N-(4-quinolylmethyl)-4-
piperidinamine or a salt thereof.
- 25 30. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
31. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 30 32. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
33. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
34. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamidobutyryl)phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine
35 or a salt thereof.
35. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamidobutyryl)phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine
or a salt thereof.
- 40 36. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-benzoyl-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
37. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
38. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-(3-carboxamidopropionyl)-4-
45 piperidinamine or a salt thereof.
39. (2R,4S)- or (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt
thereof.
- 50 40. (2S,4R)- or (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
41. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
42. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 55 43. (2R,4S)- or (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
44. (2S,4R)- or (2S,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamine or a salt thereof.


[illegible]

- (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3-chlorobenzyl)-4-piperidinamine;
 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-4-piperidinamine;
 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-4-piperidinamine;
 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorophenyl)propyl]-4-piperidinamine;
 5 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorophenyl)propyl]-4-piperidinamine;
 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chlorobenzyl)-4-piperidinamine;
 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-chlorobenzyl)-4-piperidinamine;
 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-4-piperidinamine;
 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-4-piperidinamine;
 10 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorophenyl)propyl]-4-piperidinamine;
 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorophenyl)propyl]-4-piperidinamine;
 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-methoxynaphth-1-ylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethylenedioxybenzyl)-4-piperidinamine or
 15 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(3,4-ethylenedioxybenzyl)-4-piperidinamine or a salt thereof in each case.
50. (2R,4S)- or (2R,4R)-2-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 20 51. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
52. (2R,4S)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 25 53. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,4-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
54. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(phenylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
55. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 30 56. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dibromobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
57. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 35 58. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
59. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-bromobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
60. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 40 61. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3-cyanobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
62. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(2-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 45 63. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
64. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-methyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 50 65. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-cyclohexylcarbamoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
66. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
- 55 67. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.

68. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
69. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-naphthoyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
70. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
71. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylcarbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
72. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indolylcarbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
73. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-indolylcarbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
74. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-methoxy-2-indolylcarbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
75. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(1-naphthoyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
76. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(phenylacetyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
77. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
78. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-(N-acetyl)indolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
79. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-benzo[b]furanylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
80. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-[(3-methylbenzo[b]thiophen-2-ylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
81. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-methoxyindol-3-ylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
82. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
83. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
84. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-diphenylmethyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
85. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
86. (2R*,4S*)-2-Benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
87. (2R*,4S*,1'R*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
88. (2R*,4S*,1'R*)-2-(1'-Hydroxy-1'-phenylmethyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
89. (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenylmethyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
90. (2R*,4S*,1'R*)-2-{1'-Hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)methyl}-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.

91. (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)-methyl}-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
92. (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophenyl)-methyl}-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
93. (2R*,4S*)-N-Benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
94. (2R*,4S*)-2-(4-Chlorobenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
95. (2R*,4S*)-2-(3,4-Dichlorobenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
96. (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
97. (2R*,4S*)-1-(3,5-Dichlorobenzoyl)-2-phenyl-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
98. (2R*,4S*)-1-(1-Naphthoyl)-2-phenyl-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine.
99. (2R*,4S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1-naphthyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.


100. A novel 1-acylpiperidone of the formula X



wherein R₁ is an optionally substituted aroyl, heteroaroyle, cycloalkylcarbonyl, aralkanoyl, heteroarylalkanoyl, aralkoxycarbonyl or arylcarbamoyl radical or the acyl radical of an α-amino acid which is optionally N-substituted by lower alkanoyl or carbamoyl-lower-alkanoyl, R₂ is cycloalkyl or an optionally substituted aryl or heteroaryl radical, X₁ denotes hydroxymethylene and Y₆ and Y₇ together represent oxo, or a salt thereof.


101. A compound according to claim 100, of the formula X, wherein R₁ denotes benzoyl, benzoyl mono- or disubstituted by C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthoyl, R₂ represents phenyl or phenyl mono- or disubstituted by halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, X₁ denotes hydroxymethylene and Y₆ and Y₇ together represent oxo, or a salt thereof.
102. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidone or a salt thereof.
103. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluoromethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
104. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
105. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Bistrifluoromethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
106. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Bistrifluoromethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

107. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
108. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
109. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
110. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
111. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
112. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
113. (2R*,1'R*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
114. (2R*,1'S*)-1-(3,5-Dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.
115. Compounds according to any of claims 1 to 114 for use in a method for the therapeutic treatment of the human or animal body.
116. A pharmaceutical composition comprising a compound according to any of claims 1 to 47 in free form or in pharmaceutically utilisable salt form in addition to customary pharmaceutical ancillary substances.
117. A pharmaceutical composition comprising a compound according to any of claims 48 to 115 in free form or in pharmaceutically utilisable salt form in addition to customary pharmaceutical ancillary substances.
118. Process for the preparation of novel 1-acylpiperidine compounds according to claim 1, and their salts, characterised in that
- a) the radical R₁ is introduced into a compound of the formula II




in which R₂, R₃, R₄, X₁, X₂ and X₃ have the indicated meanings, or

b) compounds of the formulae III and IV




and




in which Y_1 is a group of the formula $-N(R_3)-H$ and Y_2 is hydroxyl, reactive esterified hydroxyl or, if X_3 is carbonyl, is etherified hydroxyl, or Y_1 is hydroxyl, reactively esterified hydroxyl or, if X_2 is carbonyl, is etherified hydroxyl and Y_2 is a group of the formula $-N(R_3)-H$, where R_2, R_3, R_4, X_1, X_2 and X_3 have the indicated meanings, or the salts thereof, are condensed together or

c) for the preparation of compounds of the formula I in which one of the radicals X_2 and X_3 is alkylene and the other is alkylene, carbonyl or, in the case of X_2 , a direct linkage or, in the case of X_3 , an alkylene radical which is optionally substituted by hydroxymethyl or optionally esterified or amidated carboxyl, in a compound of the formula V




in which Z_1 is an alkylene radical which is substituted by oxo or hydroxyl in the α position to the group $-N(R_3)-$, and Z_2 is alkylene, carbonyl or an alkylene radical which is optionally substituted by hydroxymethyl or optionally esterified or amidated carboxyl, or Z_1 is alkylene, carbonyl or a direct linkage and Z_2 is an alkylene radical substituted by oxo or hydroxyl in the α position to the group $-N(R_3)-$, and R_2, R_3, R_4, X_1, X_2 and X_3 have the indicated meanings, or in a salt thereof, the oxo or hydroxyl group in the α position to the group $-N(R_3)-$ is replaced by hydrogen by reduction, or in a compound of the formula VI



in which Z_3 is a radical of the formula $-C(R_a)=C(R_b)-$ and Z_4 is alkylene, carbonyl or an alkylene radical which is optionally substituted by hydroxymethyl or optionally esterified or amidated carboxyl, or Z_3 is alkylene, carbonyl or a direct linkage and Z_4 is a radical of the formula $-C(R_a)=C(R_b)-$, where R_a and R_b are each hydrogen or lower alkyl, the radical of the formula $-C(R_a)=C(R_b)-$ is reduced by reduction of the double bond to the corresponding radical $-\text{CH}(R_a)=\text{CH}(R_b)-$, or

d) for the preparation of compounds of the formula I in which X_1 is a carbonyl or hydroxymethylene group, compounds of the formulae VII and VIII



and




in which one of the radicals Y_3 and Y_4 is formyl or an optionally anhydridised or esterified carboxyl group and the other is a metallic radical, and R_2, R_3, R_4, X_2 and X_3 have the indicated meanings,

$$\begin{array}{c}
 \text{Y}_5 \\
 | \\
 \text{R}_1 - \text{N} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{X}_2 - \text{N} - \text{X}_3 - \text{R}_4 \\
 | \\
 \text{R}_2 - \text{X}_1
 \end{array} \quad (\text{IX}),$$


in which Y₅ is an amino-protective group, and R₂, R₄, X₁, X₂ and X₃ have the indicated meanings, or from a salt thereof, or

f) for the preparation of compounds of the formula I in which X₃ is alkylene, compounds of the formulae X and XI



in which Y_6 is a group of the formula $-N(R_3)-H$, Y_7 is hydrogen, Y_8 and Y_9 together are oxo and Z_5 is an alkanylylidene radical corresponding to X_3 , or Y_6 and Y_7 together are oxo, Y_8 is a group of the formula $-N(R_3)-H$, Y_9 is hydrogen and Z_5 is a radical X_3 , are condensed together under reducing conditions and, if required, a resulting compound is converted into another compound of the formula I, a mixture of isomers which can be obtained according to the process is resolved into the components, and the isomer preferred in each case is separated off and/or a free compound which can be obtained according to the process is converted into a salt, or a salt which can be obtained according to the process is converted into the corresponding free compound.

119. Process for the preparation of novel 1-acylpiperidones according to claim 100, and salts thereof,
35 characterised in that a compound of the formula Xa




45 is condensed with an agent which introduces the radical R₁ and, if required, a resulting compound is converted into another compound of the formula I, a mixture of isomers which can be obtained according to the process is resolved into the components, and the isomer preferred in each case is separated off and/or a free compound which can be obtained according to the process is converted into a salt, or a salt which can be obtained according to the process is converted into the corresponding
50 free compound.


120. Use of a compound according to any of claims 1 to 115 to prepare a pharmaceutical for the treatment of disorders in whose development substance P plays an essential part.

Claims for the following Contracting States: ES, GR

1. Process for the preparation of novel 1-acylpiperidine compounds of the formula I




in which R₁ is phenyl- or diphenyl-C₁-C₄alkyl which is unsubstituted or substituted in the phenyl moiety by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, phenoxy-C₁-C₄alkyl which is unsubstituted or substituted in the phenyl by halogen and/or triazolyl, pyridyl- or quinoliny-C₁-C₄alkyl, benzoyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, naphthoyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, pyridylcarbonyl or quinoliny carbonyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, 5- to 7-membered cycloalkylcarbonyl which is unsubstituted or substituted by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, phenyl- or diphenyl-C₁-C₄alkanoyl which is unsubstituted or substituted in the phenyl by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, N-phenylcarbamoyl which is unsubstituted or optionally substituted in the phenyl moiety by lower alkyl, lower alkoxy, di-lower-alkylamino, halogen and/or trifluoromethyl, or a group of the formula Ia




in which R₅ is hydrogen, C₁-C₄alkyl which is unsubstituted or substituted by hydroxyl, mercapto, amino, optionally hydroxy-substituted phenyl, carboxyl, carbamoyl or ureido, and R₆ is C₂-C₇alkanoyl, R₂ is 5- to 7-membered cycloalkyl or a phenyl, naphthyl or pyridyl radical which is unsubstituted or substituted by aromatically bonded C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, R₃ is hydrogen, C₁-C₇alkyl, carbamoyl, C₂-C₇alkanoyl, carboxy-C₁-C₄alkanoyl or carboxy-C₂-C₄alkenoyl, R₄ is phenyl or naphthyl which is unsubstituted or substituted by C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, or unsubstituted pyridyl, benzofuranyl, indolyl, 2,3-dihydroindolyl, benzimidazolyl, quinolyl or 1,2,3,4-tetrahydroquinoliny, X₁ is methylene, hydroxymethylene, C₁-C₄alkoxymethylene, carbonyl, di-C₁-C₄alkoxymethylene or a direct linkage, X₂ is C₁-C₇alkylene, carbonyl or a direct linkage, and X₃ is carbonyl, C₁-C₄alkylene, carboxy-C₁-C₄alkylene, C₁-C₄alkoxycarbonyl-C₁-C₄alkylene, carbamoyl-C₁-C₄alkylene or hydroxymethyl-C₁-C₄alkylene, lower alkyl is C₁-C₇alkyl, and salts thereof, characterised in that

- a) the radical R₁ is introduced into a compound of the formula II




in which R₂, R₃, R₄, X₁, X₂ and X₃ have the indicated meanings, or

b) compounds of the formulae III and IV




and




in which Y_1 is a group of the formula $-N(R_3)-H$ and Y_2 is hydroxyl, reactive esterified hydroxyl or, if X_3 is carbonyl, is etherified hydroxyl, or Y_1 is hydroxyl, reactively esterified hydroxyl or, if X_2 is carbonyl, is etherified hydroxyl and Y_2 is a group of the formula $-N(R_3)-H$, where R_2, R_3, R_4, X_1, X_2 and X_3 have the indicated meanings, or the salts thereof, are condensed together or

c) for the preparation of compounds of the formula I in which one of the radicals X_2 and X_3 is alkylene and the other is alkylene, carbonyl or, in the case of X_2 , a direct linkage or, in the case of X_3 , an alkylene radical which is optionally substituted by hydroxymethyl or optionally esterified or amidated carboxyl, in a compound of the formula V




in which Z_1 is an alkylene radical which is substituted by oxo or hydroxyl in the α position to the group $-N(R_3)-$, and Z_2 is alkylene, carbonyl or an alkylene radical which is optionally substituted by hydroxymethyl or optionally esterified or amidated carboxyl, or Z_1 is alkylene, carbonyl or a direct linkage and Z_2 is an alkylene radical substituted by oxo or hydroxyl in the α position to the group $-N(R_3)-$, and R_2, R_3, R_4, X_1, X_2 and X_3 have the indicated meanings, or in a salt thereof, the oxo or hydroxyl group in the α position to the group $-N(R_3)-$ is replaced by hydrogen by reduction, or in a compound of the formula VI



in which Z_3 is a radical of the formula $-C(R_a)=C(R_b)-$ and Z_4 is alkylene, carbonyl or an alkylene radical which is optionally substituted by hydroxymethyl or optionally esterified or amidated carboxyl, or Z_3 is alkylene, carbonyl or a direct linkage and Z_4 is a radical of the formula $-C(R_a)=C(R_b)-$, where R_a and R_b are each hydrogen or lower alkyl, the radical of the formula $-C(R_a)=C(R_b)-$ is reduced by reduction of the double bond to the corresponding radical $-CH(R_a)=CH(R_b)-$, or

d) for the preparation of compounds of the formula I in which X_1 is a carbonyl or hydroxymethylene group, compounds of the formulae VII and VIII




and




in which one of the radicals Y_3 and Y_4 is formyl or an optionally anhydridised or esterified carboxyl group and the other is a metallic radical, and R_2 , R_3 , R_4 , X_2 and X_3 have the indicated meanings, are condensed together or

e) for the preparation of compounds of the formula I in which R_3 is hydrogen, the group Y_5 is eliminated from a compound of the formula IX




in which Y_5 is an amino-protective group, and R_2 , R_4 , X_1 , X_2 and X_3 have the indicated meanings, or from a salt thereof, or

f) for the preparation of compounds of the formula I in which X_3 is alkylene, compounds of the formulae X and XI



in which Y_6 is a group of the formula $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$, Y_7 is hydrogen, Y_8 and Y_9 together are oxo and Z_5 is an alkanylylidene radical corresponding to X_3 , or Y_6 and Y_7 together are oxo, Y_8 is a group of the formula $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$, Y_9 is hydrogen and Z_5 is a radical X_3 , are condensed together under reducing conditions and, if required, a resulting compound is converted into another compound of the formula I, a mixture of isomers which can be obtained according to the process is resolved into the components, and the isomer preferred in each case is separated off and/or a free compound which can be obtained according to the process is converted into a salt, or a salt which can be obtained according to the process is converted into the corresponding free compound.

2. Process according to claim 1, which comprises preparing a compound of the formula I in which R_1 is benzoyl, naphthoyl or phenyl- C_1 - C_4 alkanoyl which is unsubstituted or substituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, unsubstituted pyridylcarbonyl or quinolinylcarbonyl or a group of the formula Ia



in which R_5 is hydrogen, C_1 - C_4 alkyl which is unsubstituted or substituted by hydroxyl, mercapto, amino, optionally hydroxy-substituted phenyl, carboxyl, carbamoyl or ureido, and R_6 is C_2 - C_7 alkanoyl, R_2 is 5- to 7-membered cycloalkyl or a phenyl, naphthyl or pyridyl radical which is unsubstituted or substituted by aromatically bonded C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, R_3 is hydrogen, C_1 - C_7 alkyl, carbamoyl, C_2 - C_7 alkanoyl, carboxy- C_1 - C_4 alkanoyl or carboxy- C_3 - C_5 alkenoyl, R_4 is phenyl or naphthyl which is unsubstituted or substituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen and/or trifluoromethyl, or unsubstituted pyridyl, benzofuranyl, indolyl, benzimidazolyl or quinolyl, X_1 is methylene, hydroxymethylene, C_1 - C_4 alkoxymethylene, carbonyl, di- C_1 - C_4 alkoxymethylene or a direct linkage, X_2 is C_1 - C_7 alkylene, carbonyl or a direct linkage, and X_3 is carbonyl, C_1 - C_4 alkylene, carboxy- C_1 - C_4 alkylene, C_1 - C_4 alkoxycarbonyl- C_1 - C_4 alkylene, carbamoyl- C_1 - C_4 alkylene or hydroxymethyl- C_1 - C_4 alkylene, or a salt thereof.

3. Process according to claim 1, which comprises preparing a compound of the formula I in which R_1 is benzoyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthoyl or phenyl- C_1 - C_4 alkanoyl, R_2 is phenyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted pyridyl, R_3 is hydrogen, C_1 - C_4 alkyl, carbamoyl or C_2 - C_7 alkanoyl, R_4 is phenyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthyl, pyridyl, benzofuranyl, indolyl, benzimidazolyl or quinolyl, X_1 is methylene, hydroxymethylene, carbonyl or a direct linkage, X_2 is a direct linkage, and X_3 is C_1 - C_4 alkylene, or a salt thereof.
4. Process according to claim 1, which comprises preparing a compound of the formula I in which R_1 is benzoyl which is unsubstituted or mono- or disubstituted by C_1 - C_4 alkyl, C_1 - C_4 alkoxy, halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthoyl, R_2 is phenyl or phenyl mono- or disubstituted by halogen of atomic number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, R_3 is hydrogen, R_4 is unsubstituted quinolyl, X_1 is methylene, X_2 is a direct linkage and X_3 is C_1 - C_4 alkylene, or a salt thereof.
5. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-naphthoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
6. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-trifluoromethylbenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
7. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
8. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dimethoxybenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
9. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(1-naphthoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
10. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
11. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-quinolinylcarbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
12. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-chlorophenylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
13. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.

14. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-phenylethyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
15. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-naphthylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
16. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-quinolylmethyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
17. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,4-dichlorobenzyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
18. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,2-diphenylethyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
19. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(phenylcarbamoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
20. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(diphenylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
21. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-pyridylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
22. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-pyridylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
23. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,3-diphenylpropionyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
24. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)carbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
25. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-methoxybenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
26. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-N,N-dimethylaminobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
27. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(cis,cis-3,5-dimethylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
28. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
29. Process according to claim 1, which comprises preparing (2S*,4R*)-2-benzyl-1-[2-(5-chloro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenoxyethyl]-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
30. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
31. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
32. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-N-acetylphenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.

33. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-N-acetyl-phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
34. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-N-(4-carbox-
amidobutyroyl)phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
35. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-N-(4-carbox-
amidobutyroyl)phenylalanyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
36. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-benzoyl-N-(4-quinolyl-
methyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
37. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-chlorobenzoyl)-N-(4-
quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
38. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-
(4-quinolylmethyl)-N-(3-carboxamidopropionyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
39. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)- or (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-dimethyl-
benzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
40. Process according to claim 1, which comprises preparing (2S,4R)- or (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethyl-
benzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
41. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-
(3-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
42. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-
(2-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
43. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)- or (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-dimethyl-
benzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
44. Process according to claim 1, which comprises preparing (2S,4R)- or (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethyl-
benzoyl)-N-benzyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
45. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)- or (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-dimethyl-
benzoyl)-N-(4-pyridylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
46. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)- or (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-dimethyl-
benzoyl)-N-(3-pyridylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
47. Process according to claim 1, which comprises preparing (2S,4R)- or (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethyl-
benzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
48. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-
benzyl-N-carbamoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
49. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-
(3-phenylpropyl)-4-piperidinamine;
(2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(3-phenylpropyl)-4-piperidinamine;
(2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamine;
(2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamine;
(2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamine;
(2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinamine;
(2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-methoxyphenyl)propyl]-4-piperidinamine;
(2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-[3-(2-methoxyphenyl)propyl]-4-piperidinamine;
(2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-trifluoromethylbenzyl)-4-piperidinamine;

[illegible]

[illegible]


50. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)- or (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(2-phenethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
51. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
52. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
53. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,4-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
54. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(phenylacetyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
55. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
56. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dibromobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
57. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(9-fluorenyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
58. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
59. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-bromobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
60. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
61. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-cyanobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
62. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
63. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
64. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-methyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
65. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-cyclohexylcarbamoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
66. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylmethyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
67. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
68. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl)-N-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.

69. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-naphthoyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
70. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,5-dimethylbenzoyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
71. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinoly carbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
72. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indoly carbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
73. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-indoly carbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
74. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-methoxy-2-indoly carbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
75. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(1-naphthoyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
76. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(phenylacetyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
77. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-methoxybenzyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
78. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-(N-acetyl)indoly lmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
79. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-benzo[b]furany lmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
80. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-[(3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)methyl]-4-piperidinamine or a salt thereof.
81. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-methoxyindol-3-yl)methyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
82. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indoly lmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
83. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-phenylcarbamoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
84. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-diphenylmethyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
85. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
86. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-N-(4-quinoly lmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
87. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*, 1'R*)-N-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.


88. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*,1'R*)-2-(1'-hydroxy-1'-phenylmethyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
89. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phenyl-methyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
90. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*,1'R*)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)methyl}-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
91. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)methyl}-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
92. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophenyl)-methyl}-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
93. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-N-benzyl-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-4-piperidinamine or a salt thereof.
94. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-(4-chlorobenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
95. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-2-(3,4-dichlorobenzyl)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
96. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-phenyl-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
97. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-2-phenyl-N-(4-quinolinemethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
98. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-1-(1-naphthoyl)-2-phenyl-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine.
99. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1-naphthyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or a salt thereof.
100. Process according to claim 1, which comprises preparing (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2-naphthyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-methoxyphenylmethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(3-methoxyphenylmethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-trifluoromethylphenylmethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorophenylmethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethenyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-benzoyl-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2-naphthyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-methoxybenzyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(3-methoxybenzyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-trifluoromethylbenzyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorobenzyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(2-phenylethenyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine;
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(benzoylmethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or
 (2R*,4S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(4-chlorobenzoylmethyl)-N-(4-quinolinylmethyl)-4-piperidinamine or

a salt thereof in each case.

101.A process for the preparation of novel 1-acylpiperidones of the formula X



15 wherein R₁ is an optionally substituted aroyl, heteroaryl, cycloalkylcarbonyl, aralkanoyl, heteroarylal-
kanoyl, aralkoxycarbonyl or arylcarbamoyl radical or the acyl radical of an α-amino acid which is
optionally N-substituted by lower alkanoyl or carbamoyl-lower-alkanoyl, R₂ is cycloalkyl or an optionally
substituted aryl or heteroaryl radical, X₁ denotes hydroxymethylene and Y₆ and Y₇ together represent
20 oxo, and salts thereof, characterised in that a compound of the formula Xa



is condensed with an agent which introduces the radical R₁ and, if required, a resulting compound is
converted into another compound of the formula I, a mixture of isomers which can be obtained
according to the process is resolved into the components, and the isomer preferred in each case is
separated off and/or a free compound which can be obtained according to the process is converted into
30 a salt, or a salt which can be obtained according to the process is converted into the corresponding
free compound.

102.A process according to claim 101 for the preparation of compounds of the formula X wherein R₁
denotes benzoyl, benzoyl mono- or disubstituted by C₁-C₄alkyl, C₁-C₄alkoxy, halogen of atomic
35 number up to and including 35 and/or trifluoromethyl, or unsubstituted naphthoyl, R₂ represents phenyl
or phenyl mono- or disubstituted by halogen of atomic number up to and including 35 and/or
trifluoromethyl, X₁ denotes hydroxymethylene and Y₆ and Y₇ together represent oxo, and salts thereof.

103.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-(1'-
40 hydroxy-1'-phenyl-methyl)-4-piperidone or a salt thereof.

104.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-bistrifluoromethylben-
zoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

45 105.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-
hydroxy-1'-(3,4-dichlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

106.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'S*)-1-(3,5-bistrifluoromethylben-
zoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

50 107.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-bistrifluoromethylben-
zoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

108.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-
55 hydroxy-1'-(4-methoxy-phenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

109.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-
hydroxy-1'-(4-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

110.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

111.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-methoxyphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.


112.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

113.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

114.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'R*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

115.A process according to claim 101, which comprises preparing (2R*,1'S*)-1-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluoromethylphenyl)methyl}-4-piperidone or a salt thereof.

116.A process for the preparation of a pharmaceutical composition, characterised in that a 1-acylpiperidine compound of the formula I or X




in which R₁ in formula I is an optionally substituted aralkyl, heteroalkyl, aroyl, heteroaroyl, cycloalkylcarbonyl, aralkanoyl, heteroarylalkanoyl, aralkoxycarbonyl or arylcarbamoyl radical or the acyl radical of an α-amino acid which is optionally N-substituted by lower alkanoyl or carbamoyl-lower-alkanoyl, R₂ is cycloalkyl or an optionally substituted aryl or heteroaryl radical or in formula X is an optionally substituted aroyl, heteroaroyl, cycloalkylcarbonyl, aralkanoyl, heteroarylalkanoyl, aralkoxycarbonyl or arylcarbamoyl radical or the acyl radical of an α-amino acid which is optionally N-substituted by lower alkanoyl or carbamoyl-lower-alkanoyl, R₃ is hydrogen, alkyl, carbamoyl or an alkanoyl or alkenoyl radical which is optionally substituted by carboxyl or esterified or amidated carboxyl, R₄ is an optionally substituted aryl or optionally partially hydrogenated heteroaryl radical, X₁ in formula I is methylene, ethylene, a direct linkage, an optionally ketalised carbonyl group or an optionally etherified hydroxymethylene group or in formula X is hydroxymethylene, X₂ is alkylene, carbonyl or a direct linkage, and X₃ is carbonyl, oxo-lower-alkylene, oxo(aza)-lower-alkylene or an alkylene radical which is optionally substituted by phenyl, hydroxymethyl, optionally esterified or amidated carboxyl or, in higher than the α position, by hydroxyl, and Y₆ and Y₇ together represent oxo, or a pharmaceutically utilisable salt thereof, is mixed with customary pharmaceutical ancillary substances.


Revendications

Revendications pour les Etats contractants suivants : AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE

- 5 1. Un composé 1-acylpipéridine de formule I



15 où R₁ représente un phénylalkyle en C₁-C₄ ou un diphenylalkyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué dans la partie phényle par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou un trifluorométhyle, un phénoxyalkyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué dans la partie phényle par un halogène et/ou un triazolyle, un pyridylalkyle en C₁-C₄ ou un quinoléinylalkyle en C₁-C₄, un benzoyle non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un naphtoyle non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, le pyridylcarbonyle ou le quinoléinylcarbonyle non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un cycloalkylcarbonyle ayant 5 à 7 chaînons non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un phénylalkanoyle en C₁-C₄ ou un diphenylalkanoyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué dans la partie phényle par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un N-phénylcarbamoyle non substitué ou substitué dans la partie phényle éventuellement par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle ou un groupe de formule Ia



40 dans laquelle R₅ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué par l'hydroxy, le mercapto, l'amino, un phényle éventuellement substitué par l'hydroxy, le carboxy, le carbamoyle ou l'uréido et R₆ représente un alcanoyle en C₂-C₇, R₂ représente un cycloalkyle ayant 5 à 7 chaînons ou un reste phényle, naphtyle ou pyridyle non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle aromatiquement lié, R₃ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₇, le carbamoyle, un alcanoyle en C₂-C₇, un carboxyalkanoyle en C₁-C₄ ou un carboxyalcénoyle en C₂-C₄, R₄ représente un phényle ou un naphtyle non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle ou le pyridyle non substitué, le benzofuranyle, l'indolyle, le 2,3-dihydroindolyle, le benzimidazolyle, le quinolyle ou le 1,2,3,4-tétrahydroquinoléinyle, X₁ représente le méthylène, l'hydroxyméthylène, un alcoxy en C₁-C₄ méthylène, le carbonyle ou un dialcoxy en C₁-C₄ méthylène ou une liaison directe, X₂ représente un alkylène en C₁-C₇, le carbonyle ou une liaison directe et X₃ représente le carbonyle, un alkylène en C₁-C₄, un carboxyalkylène en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄ carbonylalkylène en C₁-C₄, un carbamoylalkylène en C₁-C₄ ou un hydroxyméthylalkylène en C₁-C₄ ou l'un de ses sels, un alkyle inférieur étant un alkyle en C₁-C₇.

- 55 2. Un composé de formule I selon la revendication 1 où R₁ représente le benzoyle, le naphtoyle ou un phénylalkanoyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un pyridylcarbonyle ou un quinoléinylcarbonyle non substitué ou un groupe de formule Ia



5

dans laquelle R₅ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué par l'hydroxy, le mercapto, l'aminow un phényle éventuellement substitué par l'hydroxy, le carboxy, le carbamoyle ou l'uréido et R₆ représente un alcanoyle en C₂-C₇, R₂ représente un cycloalkyle ayant 5 à 7 chaînons ou un reste phényle, naphthyle ou pyridyle non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle aromatiquement lié, R₃ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₇, un carbamoyle, un alcanoyle en C₂-C₇, un carboxyalcanoyle en C₁-C₄ ou un carboxyalcénoyle en C₃-C₅, R₄ représente un phényle ou un naphthyle non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle ou le pyridyle, le benzofuranyle, l'indolyle, le benzimidazolyle ou le quinolyle non substitué, X₁ représente le méthylène, l'hydroxyméthylène, un alcoxy en C₁-C₄ méthylène, le carbonyle, un dialcoxy en C₁-C₄ méthylène ou une liaison directe, X₂ représente un alkylène en C₁-C₇, le carbonyle ou une liaison directe et X₃ représente un carbonyle, un alkylène en C₁-C₄, un carboxyalkylène en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄ carbonylalkylène en C₁-C₄, un carbamoylalkylène en C₁-C₄ ou un hydroxyméthylalkylène en C₁-C₄ ou l'un de ses sels.

20

3. Un composé de formule I selon la revendication 1 où R₁ représente un benzoyle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un naphthyle ou un phénylcanoyle en C₁-C₄ non substitué, R₂ représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un pyridyle non substitué, R₃ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₄, un carbamoyle ou un alcanoyle en C₂-C₇, R₄ représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un naphthyle, pyridyle, benzofuranyle, indolyle, benzimidazolyle ou quinolyle non substitué, X₁ représente le méthylène, l'hydroxyméthylène, le carbonyle ou une liaison directe, X₂ représente une liaison directe et X₃ représente un alkylène en C₁-C₄ ou l'un de ses sels.

25

4. Un composé de formule I selon la revendication 1 où R₁ représente un benzoyle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un naphthyle non substitué, R₂ représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué par un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle, R₃ représente l'hydrogène, R₄ représente un quinolyle non substitué, X₁ le méthylène, X₂ une liaison directe et X₃ un alkylène en C₁-C₄ ou l'un de ses sels.

40

5. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-naphtoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

45

6. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-trifluorométhylbenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

50

7. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis-(trifluorométhyl)-benzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

55

8. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

60

9. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(1-naphtoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

65

10. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

70

11. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-quinoléinylcarbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

12. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-chlorophénylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
13. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(benzyloxycarbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
14. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-phényléthyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
15. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-naphtylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
16. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-quinolylméthyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
17. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,4-dichlorobenzyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
18. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-[2,2-diphényléthyl]-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
19. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-[phénylcarbamoyle]-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
20. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(diphénylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
21. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-pyridylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
22. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-pyridylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
23. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,3-diphénylpropionyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
24. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tétrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
25. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-méthoxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
26. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-N,N-diméthylaminobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
27. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-[cis,cis-3,5-diméthylcyclohexylcarbonyl]-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
28. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis-(trifluorométhyl)-benzyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
29. La (2S*,4R*)-2-benzyl-1-[2-(5-chloro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-phénoxyéthyl]-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
30. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
31. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
32. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-N-acétyl-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
33. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-N-acétylphénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
34. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamidobutyroyle)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
35. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamidobutyroyle)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

36. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-benzoyl-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
37. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 5 38. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-(3-carboxamidopropionyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
39. La (2R,4S)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
- 10 40. La (2S,4R)- ou la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-phénéthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
41. La (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 15 42. La (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
43. La (2R,4S)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-benzyl-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
- 20 44. La (2S,4R)- ou la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-benzyl-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
45. La (2R,4S)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-pyridylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
- 25 46. La (2R,4S)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-pyridylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
- 30 47. La (2S,4R)- et la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
48. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-benzyl-N-carbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 35 49. La (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-phénylpropyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-phénylpropyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-méthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-méthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
40 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-méthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-méthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-méthoxyphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-méthoxyphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
45 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
50 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(3-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(3-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(3-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
55 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(3-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(4-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;

[illegible]


[illegible]

[illegible]

- la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(2-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
 5 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 10 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-méthoxynaph-1-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-méthoxynaph-1-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(3,4-éthylènedioxybenzyl)-4-pipéridineamine ; ou
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(3,4-éthylènedioxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
 ou l'un des sels de chacun de ces composés.
- 15 50. La (2R,4S)- et la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-phénéthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
51. La (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-bis-(trifluorométhyl)-benzoyl)-N-4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 20 52. La (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
53. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,4-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 25 54. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(phénylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
55. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine.
- 30 56. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dibromobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
57. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(9-fluorénoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 35 58. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
59. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-bromobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 40 60. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
61. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-cyanobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 45 62. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
63. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
64. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-méthyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 50 65. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-cyclohexylcarbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 55 66. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-phénylcarbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
67. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-phényléthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

68. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis-(trifluorométhyl)-benzoyl)-N-(2-phényléthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
69. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-naphtoyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
70. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,5-diméthylbenzoyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
71. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
72. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
73. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-indolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
74. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-méthoxy-2-indolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
75. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(1-naphtoyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
76. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(phénylacétyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
77. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-méthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
78. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-(N-acétyl)-indolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
79. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-benzo[b]furanylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
80. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-[(3-méthylbenzo[b]thiophén-2-ylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
81. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-méthoxyindol-3-ylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
82. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
83. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-phénylcarbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
84. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-diphénylméthyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
85. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyranne-2-carbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
86. La (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-méthoxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
87. La (2R*,4S*,1'R*)-N-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
88. La (2R*,4S*,1'R*)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléthylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
89. La (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-N-(4-quinoléthylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.


90. La (2R*,4S*,1'R*)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)-méthyl}-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
91. La (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)-méthyl}-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
92. La (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophényl)-méthyl}-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
93. La (2R*,4S*)-N-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-benzoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
94. La (2R*,4S*)-2-(4-chlorobenzyl)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
95. La (2R*,4S*)-2-(3,4-dichlorobenzyl)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
96. La (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-phényl-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
97. La (2R*,4S*)-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-2-phényl-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
98. La (2R*,4S*)-1-(1-naphtoyl)-2-phényl-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine.
99. La (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1-naphtyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
100. Une nouvelle 1-acylpipéridone de formule X



(X)


- où R₁ représente un reste aroyle, hétéroaroyle, cycloalkylcarbonyle, aralcanoyl, hétéroarylcanoyl, aralcoycarbonyl ou arylcarbamoyl éventuellement substitué ou le reste acyle d'un α-amino-acide éventuellement N-substitué par un alcanoyl inférieur ou par un carbamoylcanoyl inférieur, R₂ représente un cycloalkyle ou un reste aryle ou hétéroaroyle éventuellement substitué, X₁ représente l'hydroxyméthylène et Y₆ et Y₇ représentent ensemble un oxo ou l'un de ses sels.
101. Un composé de formule X selon la revendication 100 où R₁ représente un benzoyl non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un naphtoyl non substitué, R₂ représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué, par un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle, X₁ représente l'hydroxyméthylène et Y₆ et Y₇ représentent ensemble un oxo ou l'un de ses sels.
102. La (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
103. La (2R*,1'R*)-1-(3,5-bis-trifluorométhylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

- 104.La (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophénylméthyl)-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 105.La (2R*,1'S*)-1-(3,5-bis-trifluorométhylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 106.La (2R*,1'R*)-1-(3,5-bis-trifluorométhylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 107.La (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 108.La (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 109.La (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 110.La (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 111.La (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluorométhylphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 112.La (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluorométhylphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 113.La (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluorométhylphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 114.La (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluorométhylphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.
- 115.Composés selon l'une des revendications 1 à 114 destinés à être utilisés dans un procédé pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal.
- 116.Préparations pharmaceutiques contenant comme substance active pharmaceutique, à côté des adjuvants pharmaceutiques usuels, un composé selon l'une des revendications 1 à 47 sous forme libre ou sous la forme d'un sel pharmaceutiquement utilisable.
- 117.Préparations pharmaceutiques contenant comme substance active pharmaceutique, à côté des adjuvants pharmaceutiques usuels, un composé selon l'une des revendications 48 à 115 sous forme libre ou sous la forme d'un sel pharmaceutiquement utilisable.
- 118.Procédé pour la préparation des nouveaux composés 1-acylpipéridines selon la revendication 1 et de leurs sels, caractérisé
- a) en ce que l'on introduit dans un composé de formule II




où R₂, R₃, R₄, X₁, X₂ et X₃ ont les significations qui ont été indiquées, le reste R₁ ou

b) en ce que l'on condense les composés de formules III et IV



et



où Y_1 représente un groupe de formule $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$ et Y_2 représente un hydroxy, un hydroxy estérifié réactif ou, si X_3 représente un carbonyle, un hydroxy étherifié ou Y_1 représente un hydroxy, un hydroxy estérifié réactif ou, si X_2 représente un carbonyle, un hydroxy étherifié et Y_2 un groupe de


formule $-\text{N}(\text{R}_3)-\text{H}$, R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 et X_3 ayant les significations indiquées ou leurs sels ou

c) en ce que pour la préparation des composés de formule I où l'un des restes X_2 et X_3 représente


un alkylène et l'autre reste représente un alkylène, le carbonyle ou, dans le cas de X_2 une liaison

directe ou dans le cas de X_3 , un reste alkylène éventuellement substitué par l'hydroxyméthyle ou

par un carboxy éventuellement estérifié ou amidé, l'on remplace dans un composé de formule V




où Z_1 représente un reste alkylène substitué par un oxo ou par un hydroxy en position α par rapport au groupe $-\text{N}(\text{R}_3)-$ et Z_2 représente un alkylène, le carbonyle ou un reste alkylène éventuellement substitué par l'hydroxyméthyle ou par un carboxy éventuellement estérifié ou amidé ou Z_1 représente un alkylène, le carbonyle ou une liaison directe et Z_2 représente un reste alkylène substitué par un oxo ou un hydroxy en position α par rapport au groupe $-\text{N}(\text{R}_3)-$ et R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 et X_3 ont les significations qui ont été indiquées ou dans l'un de ses sels, le groupe oxo ou le groupe hydroxy en position α par rapport au groupe $-\text{N}(\text{R}_3)-$ par l'hydrogène par voie de réduction ou en ce que dans un composé de formule VI



où Z_3 représente un reste de formule $-\text{C}(\text{R}_a)=\text{C}(\text{R}_b)-$ et Z_4 représente un alkylène, le carbonyle ou un reste alkylène éventuellement substitué par l'hydroxyméthyle ou par un carboxy éventuellement estérifié ou amidé ou Z_3 représente un alkylène, le carbonyle ou une liaison directe et Z_4 représente un reste de formule $-\text{C}(\text{R}_a)=\text{C}(\text{R}_b)-$, R_a et R_b représentant l'hydrogène ou un alkyle inférieur, l'on réduit le reste de formule $-\text{C}(\text{R}_a)=\text{C}(\text{R}_b)-$ par réduction de la double liaison en un reste correspondant $-\text{CH}(\text{R}_a)-\text{CH}(\text{R}_b)-$ ou

d) en ce que pour la préparation des composés de formule I où X_1 représente un groupe carbonyle ou un groupe hydroxyméthylène, on condense les composés de formules VII et VIII




et

$\text{Y}_4\text{-R}_2$ (VIII),


où l'un des restes Y_3 et Y_4 représente le formyle ou un groupe carboxy éventuellement anhydridé ou estérifié et l'autre groupe un reste métallique et R_2 . R_3 , R_4 , X_2 et X_3 ont les significations qui ont été indiquées ou

e) en ce que pour la préparation des composés de formule I où R_3 représente l'hydrogène, l'on clive dans un composé de formule IX




où Y_5 représente un groupe protecteur de l'amino et R_2 , R_4 , X_1 , X_2 et X_3 ont les significations qui ont été indiquées, ou dans l'un de ses sels le groupe Y_5 ou

f) en ce que pour la préparation des composés de formule I où X_3 représente un alkylène, on condense, dans des conditions réductrices, les composés de formules X et XI



où Y_6 représente un groupe de formule $-\text{N}(\text{R}_3)\text{-H}$, Y_7 représente l'hydrogène, Y_8 et Y_9 représentent ensemble un oxo et X_5 un reste alcanylylidène correspondant X_3 ou Y_6 et Y_7 représentent ensemble un oxo, Y_8 un groupe de formule $-\text{N}(\text{R}_3)\text{-H}$, Y_9 l'hydrogène et Z_5 un reste X_3 , et en ce que, si désiré, l'on transforme le composé obtenu en un autre composé de formule I, en ce que l'on sépare le mélange d'isomères obtenu conformément au procédé de l'invention en ses composants, en ce que l'on sépare l'isomère préféré et/ou en ce que l'on transforme le composé libre obtenu conformément au procédé de l'invention en un sel ou le sel obtenu conformément au procédé de l'invention en un composé libre correspondant.

119. Procédé pour la préparation des nouvelles 1-acylpipéridones selon la revendication 100 et de leurs sels, caractérisé en ce que l'on condense un composé de formule Xa




10 avec un composé introduisant le reste R_1 et, si désiré, en ce que l'on transforme le composé obtenu en un autre composé de formule I, en ce que l'on sépare le mélange d'isomères obtenu conformément au procédé de l'invention, en ses composants et en ce que l'on sépare l'isomère préféré et/ou en ce que l'on transforme le composé libre obtenu conformément au procédé de l'invention en un sel ou le sel obtenu par le procédé conforme à l'invention en un composé libre correspondant.


15 **120.** Utilisation d'un composé selon l'une des revendications 1 à 115 pour la préparation d'un médicament déterminé pour le traitement des maladies dans l'apparition desquelles la substance P joue un rôle important.

20 **Revendications pour les Etats contractants suivants : ES, GR**

1. Procédé pour la préparation des nouveaux composés 1-acylpipéridines de formule I




où R_1 représente un phénylalkyle en C_1-C_4 ou un diphenylalkyle en C_1-C_4 non substitué ou substitué dans la partie phényle par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou un trifluorométhyle, un phénoxyalkyle en C_1-C_4 non substitué ou substitué dans la partie phényle par un halogène et/ou un triazolyle, un pyridylalkyle en C_1-C_4 ou un quinolénylalkyle en C_1-C_4 , un benzoyle non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un naphtoyle non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, le pyridylcarbonyle ou le quinolénylcarbonyle non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un cycloalkylcarbonyle ayant 5 à 7 chaînons non substitué ou substitué par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un phénylalkanoyle en C_1-C_4 ou un diphenylalkanoyle en C_1-C_4 non substitué ou substitué dans la partie phényle par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un N-phénylcarbamoyle non substitué ou substitué dans la partie phényle éventuellement par un alkyle inférieur, un alcoxy inférieur, un dialkyle inférieur amino, un halogène et/ou le trifluorométhyle ou un groupe de formule Ia



55 dans laquelle R_5 représente l'hydrogène, un alkyle en C_1-C_4 non substitué ou substitué par l'hydroxy, le mercapto, l'amino, un phényle éventuellement substitué par l'hydroxy, le carboxy, le carbamoyle ou l'uréido et R_6 représente un alcanoyle en C_2-C_7 , R_2 représente un cycloalkyle ayant 5 à 7 chaînons ou un reste phényle, naphtyle ou pyridyle non substitué ou substitué par un alkyle en C_1-C_4 , un alcoxy en


C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle aromatiquement lié, R₃ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₇, le carbamoyle, un alcanoyle en C₂-C₇, un carboxyalkanoyle en C₁-C₄ ou un carboxyalcénoyle en C₂-C₄, R₄ représente un phényle ou un naphtyle non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle ou le pyridyle non substitué, le benzofuranyle, l'indolyle, le 2,3-dihydroindolyle, le benzimidazolyle, le quinolyle ou le 1,2,3,4-tétrahydroquinolényle, X₁ représente le méthylène, l'hydroxyméthylène, un alcoxy en C₁-C₄ méthylène, le carbonyle ou un dialcoxy en C₁-C₄ méthylène ou une liaison directe, X₂ représente un alkylène en C₁-C₇, le carbonyle ou une liaison directe et X₃ représente le carbonyle, un alkylène en C₁-C₄, un carboxyalkylène en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄ carbonylalkylène en C₁-C₄, un carbamoylalkylène en C₁-C₄ ou un hydroxyméthylalkylène en C₁-C₄, un alkyle inférieur étant un alkyle en C₁-C₇, et de leurs sels, caractérisé

a) en ce que l'on introduit dans un composé de formule II



où R₂, R₃, R₄, X₁, X₂ et X₃ ont les significations qui ont été indiquées, le reste R₁ ou

b) en ce que l'on condense les composés de formules III et IV




et

Y₂-X₃-R₄ (IV),


où Y₁ représente un groupe de formule -N(R₃)-H et Y₂ représente un hydroxy, un hydroxy estérifié réactif ou, si X₃ représente un carbonyle, un hydroxy étherifié ou Y₁ représente un hydroxy, un hydroxy estérifié réactif ou, si X₂ représente un carbonyle, un hydroxy étherifié et Y₂ un groupe de formule -N(R₃)-H, R₂, R₃, R₄, X₁, X₂ et X₃ ayant les significations indiquées ou leurs sels ou

c) en ce que pour la préparation des composés de formule I où l'un des restes X₂ et X₃ représente un alkylène et l'autre reste représente un alkylène, le carbonyle ou, dans le cas de X₂, une liaison directe ou dans le cas de X₃, un reste alkylène éventuellement substitué par l'hydroxyméthyle ou par un carboxy éventuellement estérifié ou amidé, l'on remplace dans un composé de formule V




où Z₁ représente un reste alkylène substitué par un oxo ou par un hydroxy en position α par rapport au groupe -N(R₃)- et Z₂ représente un alkylène, le carbonyle ou un reste alkylène éventuellement substitué par l'hydroxyméthyle ou par un carboxy éventuellement estérifié ou amidé ou Z₁ représen-

te un alkylène, le carbonyle ou une liaison directe et Z_2 représente un reste alkylène substitué par un oxo ou un hydroxy en position α par rapport au groupe $-N(R_3)-$ et R_2 , R_3 , R_4 , X_1 , X_2 et X_3 ont les significations qui ont été indiquées ou dans l'un de ses sels le groupe oxo ou le groupe hydroxy en position α par rapport au groupe $-N(R_3)-$ par l'hydrogène par voie de réduction ou en ce que dans un composé de formule VI



où Z_3 représente un reste de formule $-C(R_a)=C(R_b)-$ et Z_4 représente un alkylène, le carbonyle ou un reste alkylène éventuellement substitué par l'hydroxyméthyle ou par un carboxy éventuellement estérifié ou amidé ou Z_3 représente un alkylène, le carbonyle ou une liaison directe et Z_4 représente un reste de formule $-C(R_a)=C(R_b)-$, R_a et R_b , représentant l'hydrogène ou un alkyle inférieur, l'on réduit le reste de formule $-C(R_a)=C(R_b)-$ par réduction de la double liaison en un reste correspondant $-CH(R_a)-CH(R_b)-$ ou

d) en ce que pour la préparation des composés de formule I où X_1 représente un groupe carbonyle ou un groupe hydroxyméthylène, on condense les composés de formules VII et VIII




et

Y_4-R_2 (VIII),


où l'un des restes Y_3 et Y_4 représente le formyle ou un groupe carboxy éventuellement anhydride ou estérifié et l'autre groupe un reste métallique et R_2 , R_3 , R_4 , X_2 et X_3 ont les significations qui ont été indiquées ou

e) en ce que pour la préparation des composés de formule I où R_3 représente l'hydrogène, l'on clive dans un composé de formule IX



où Y_5 représente un groupe protecteur de l'amino et R_2 , R_4 , X_1 , X_2 et X_3 ont les significations qui ont été indiquées, ou dans l'un de ses sels le groupe Y_5 ou

f) en ce que pour la préparation des composés de formule I où X_3 représente un alkylène, on condense, dans des conditions réductrices, les composés de formule X et XI



5

10 où Y₆ représente un groupe de formule -N(R₃)-H, Y₇ représente l'hydrogène, Y₈ et Y₉ représentent ensemble un oxo et Z₅ un reste alcanylylidène correspondant X₃ ou Y₆ et Y₇ représentent ensemble un oxo, Y₈ un groupe de formule -N(R₃)-H, Y₉ l'hydrogène et Z₅ un reste X₃, et en ce que, si désiré, l'on transforme le composé obtenu en un autre composé de formule I, en ce que l'on sépare le mélange d'isomères obtenu conformément au procédé de l'invention, en ses composants et en ce que l'on sépare l'isomère préféré et/ou en ce que l'on transforme le composé libre obtenu conformément au procédé de l'invention en un sel ou le sel obtenu par le procédé conforme à l'invention en un composé libre correspondant.

15

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare un composé de formule I où R₁ représente le benzoyle, le naphtoyle ou un phénylalkanoyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle, un pyridylcarbonyle ou un quinoldinylcarbonyle non substitué ou un groupe de formule la

20

25



30 dans laquelle R₅ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₄ non substitué ou substitué par l'hydroxy, le mercapto, l'aminow un phényle éventuellement substitué par l'hydroxy, le carboxy, le carbamoyle ou l'uréido et R₆ représente un alcanoyle en C₂-C₇, R₂ représente un cycloalkyle ayant 5 à 7 chaînons ou un reste phényle, naphtyle ou pyridyle non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle aromatiquement lié, R₃ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₇, un carbamoyle, un alcanoyle en C₂-C₇, un carboxyalcanoyle en C₁-C₄ ou un carboxyalcénoyle en C₃-C₅, R₄ représente un phényle ou un naphtyle non substitué ou substitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène et/ou le trifluorométhyle ou le pyridyle, le benzofuranyle, l'indolye, le benzimidazolyle ou le quinolye non substitué, X₁ représente le méthylène, l'hydroxyméthylène, un alcoxy en C₁-C₄ méthylène, le carbonyle, un dialcoxy en C₁-C₄ méthylène ou une liaison directe, X₂ représente un alkylène en C₁-C₇, le carbonyle ou une liaison directe et X₃ représente un carbonyle, un alkylène en C₁-C₄, un carboxyalkylène en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄ carbonylalkylène en C₁-C₄, un carbamoylalkylène en C₁-C₄ ou un hydroxyméthylalkylène en C₁-C₄ ou l'un de ses sels.

30

35

40

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare un composé de formule I où R₁ représente un benzoyle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un naphoyle ou un phénylalkanoyle en C₁-C₄ non substitué, R₂ représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un pyridyle non substitué, R₃ représente l'hydrogène, un alkyle en C₁-C₄, un carbamoyle ou un alcanoyle en C₂-C₇, R₄ représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un naphtyle, pyridyle, benzofuranyle, indolye, benzimidazolyle ou quinolye non substitué, X₁ représente le méthylène, l'hydroxyméthylène, le carbonyle ou une liaison directe, X₂ représente une liaison directe et X₃ représente un alkylène en C₁-C₄ ou l'un de ses sels.

45

50

55

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare un composé de formule I où R₁ représente un benzoyle non substitué ou mono- ou disubstitué par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un

naphtoyl non substitué, R_2 représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué par un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle, R_3 représente l'hydrogène, R_4 représente un quinolyne non substitué, X_1 le méthylène, X_2 une liaison directe et X_3 un alkylène en C_1 - C_4 ou l'un de ses sels.

5

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-naphtoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

10

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-trifluorométhylbenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis-(trifluorométhyl)-benzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

15

8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

9. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*, 4S*)-2-benzyl-1-(1-naphtoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

20

10. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

25

11. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-quinoléinylcarbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

12. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-chlorophénylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

30

13. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(benzyloxy-carbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

14. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-phényléthyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

35

15. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-naphtylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

40

16. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-quinolylméthyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

17. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,4-dichlorobenzyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

45

18. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,2-diphényléthyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

19. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(phénylcarbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

50

20. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(diphénylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

55

21. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-pyridylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

22. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-pyridylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

23. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,3-diphénylpropionyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 5 24. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((3S)-(2,3,4,9-tétrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-3-yl)-carbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
25. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-méthoxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 10 26. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-N-diméthylaminobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 15 27. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(cis,cis-3,5-diméthylcyclohexylcarbonyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
28. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis(trifluorométhyl)-benzyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 20 29. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2S*,4R*)-2-benzyl-1-[2-(5-chloro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-phénoxyéthyl]-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 25 30. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
31. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
32. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-N-acétyl-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 30 33. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-N-acétyl-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 35 34. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((S)-N-(4-carboxamidobutyryl)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
35. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-((R)-N-(4-carboxamidobutyryl)-phénylalanyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 40 36. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-benzoyl-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
37. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 45 38. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-(3-carboxamidopropionyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 50 39. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
40. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2S,4R)- ou la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-phénéthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
- 55 41. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

42. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
43. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-benzyl-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
44. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2S,4R)- ou la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-benzyl-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
45. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-pyridylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
46. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)- ou la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-pyridylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
47. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2S,4R)- et la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
48. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-benzyl-N-carbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
49. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-phénylpropyl)-4-pipéridineamine ;
 (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-phénylpropyl)-4-pipéridineamine ;
 (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-méthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-méthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-méthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-méthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-méthoxyphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-méthoxyphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(3-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(3-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(3-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(3-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(3-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-trifluorométhylbenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(4-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(4-trifluorométhylphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(4-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(4-trifluorométhylphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2,3-diméthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2,3-diméthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2,3-diméthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2,3-diméthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2,3-diméthoxyphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[3-(2,3-diméthoxyphényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2,4-diméthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2,4-diméthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2,4-diméthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-[2-(2,4-diméthoxyphényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;

[illegible]


- la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-méthoxynapht-1-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-éthylènedioxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-éthylènedioxybenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(indol-2-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
5 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(indol-2-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(indol-3-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(indol-3-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(quinoléin-2-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(quinoléin-2-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
10 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(quinoléin-3-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(quinoléin-3-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(2-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(2-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(2-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
15 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(2-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(2-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(2-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(3-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(3-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
20 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(3-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(3-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
25 la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-chlorobenzyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[2-(4-chlorophényl)-éthyl]-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-[3-(4-chlorophényl)-propyl]-4-pipéridineamine ;
30 la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-méthoxynapht-1-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(4-méthoxynapht-1-ylméthyl)-4-pipéridineamine ;
la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(3,4-éthylènedioxybenzyl)-4-pipéridineamine et ou
la (2S,4S)-2-benzyl-1-(3,5-diméthoxybenzoyl)-N-(3,4-éthylènedioxybenzyl)-4-pipéridineamine.
ou l'un des sels de chacun de ces composés.
- 35
50. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)- et la (2R,4R)-2-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(2-phénéthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de leurs sels.
51. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-bis-(trifluorométhyl)-benzoyl)-4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 40
52. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R,4S)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
53. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,4-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 45
54. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(phénylacétyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 50
55. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2,6-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine.
56. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dibromobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 55
57. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(9-fluorénoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

58. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-toluoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
59. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-bromobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
60. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dihydroxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
61. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3-cyanobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
62. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(2-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
63. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-chlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
64. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-méthyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
65. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*, 4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-cyclohexylcarbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
66. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*, 4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-N-phénylcarbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
67. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-phényléthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
68. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-bis-(trifluorométhyl)-benzoyl)-N-(2-phényléthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
69. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-naphtoyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
70. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,5-diméthylbenzoyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
71. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(4-quinolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
72. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
73. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-indolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
74. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-méthoxy-2-indolylcarbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
75. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(1-naphtoyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
76. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(phénylacétyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.

77. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-méthoxybenzyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 5 78. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-(N-acétyl)-indolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
79. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4St)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(2-benzo[b]furanylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 10 80. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-[(3-méthylbenzo[b]thiophén-2-ylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
81. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(5-méthoyindol-3-ylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 15 82. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3-indolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
83. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-phénylcarbamoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 20 84. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-diphénylméthyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 25 85. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-N-(3,4-dihydro-2H-1benzopyranne-2-carbonyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
86. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-benzyl-1-(4-méthoxybenzoyl)-N-(4-quinolylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 30 87. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*,1'R*)-N-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
88. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*,1'R*)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 35 89. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*, 4S*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-N-(quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 40 90. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*,1'R*)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)-méthyl}-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
91. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)-méthyl}-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 45 92. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophényl)-méthyl}-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 50 93. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-N-benzyl-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-benzoyl-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
- 55 94. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-(4-chlorobenzyl)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.


95. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-2-(3,4-dichlorobenzyl)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
96. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-phényl-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
97. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-1-(3,5-dichlorobenzoyl)-2-phényl-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
98. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-1-(1-naphtoyl)-2-phényl-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine.
99. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1-naphtyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou l'un de ses sels.
100. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on prépare
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2-naphtyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-méthoxyphénylméthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(3-méthoxyphénylméthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-trifluorométhylphénylméthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorophénylméthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2-phényléthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2-phényléthényl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-benzyl-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-chlorobenzoyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2-naphtyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-méthoxybenzyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(3-méthoxybenzyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-nitrobenzyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-trifluorométhylbenzyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2,4-dichlorobenzyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2-phényléthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(2-phényléthényl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ;
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(benzoylméthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine ou
 la (2R*,4S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(4-chlorobenzoylméthyl)-N-(4-quinoléinylméthyl)-4-pipéridineamine
 ou l'un des sels de chacun de ces composés.

101. Procédé pour la préparation des nouvelles 1-acylpipéridones de formule X



où R₁ représente un reste aroyle, hétéroaroyle, cycloalkylcarbonyle, aralcanoyale, hétéroaryalcanoyale, aralcoyloxycarbonyle ou arylcarbamoyale éventuellement substitué ou le reste acyle d'un α-amino-acide éventuellement N-substitué par un alcanoyale inférieur ou par un carbamoylalcanoyale inférieur, R₂ représente un cycloalkyle ou un reste aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué, X₁ représente l'hydroxyméthylène et Y₆ et Y₇ représentent ensemble un oxo et de leurs sels, caractérisé en ce que

l'on condense un composé de formule Xa



10 avec un composé introduisant le reste R₁ et, si désiré, en ce que l'on transforme le composé obtenu en un autre composé de formule I, en ce que l'on sépare le mélange d'isomères obtenu conformément au procédé de l'invention, en ses composants et en ce que l'on sépare l'isomère préféré et/ou en ce que l'on transforme le composé libre obtenu conformément au procédé de l'invention en un sel ou le sel obtenu par le procédé conforme à l'invention en un composé libre correspondant.

15 **102.** Procédé selon la revendication 101 pour la préparation des composés de formule X où R₁ représente un benzoyle non substitué ou mono- ou disubstitué, par un alkyle en C₁-C₄, un alcoxy en C₁-C₄, un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle ou un naphthoyle non substitué, R₂ représente un phényle non substitué ou mono- ou disubstitué par un halogène ayant un numéro atomique allant jusqu'à 35 et/ou le trifluorométhyle, X₁ représente l'hydroxyméthylène et Y₆ et Y₇ représentent ensemble un oxo ou l'un de ses sels.

25 **103.** Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-phénylméthyl)-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

104. Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-bis-trifluorométhylbenzoyl)-2-(1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)méthyl)-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

30 **105.** Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

106. Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'S*)-1-(3,5-bis-trifluorométhylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chlorophényl)méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

35 **107.** Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-bis-trifluorométhylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3,4-dichlorophényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

108. Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

109. Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

45 **110.** Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

111. Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(3-méthoxyphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.


50 **112.** Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluorométhylphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

113. Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-trifluorométhylphényl)méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

55 **114.** Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'R*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluorométhylphényl)-méthyl}-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

115. Procédé selon la revendication 101, caractérisé en ce que l'on prépare la (2R*,1'S*)-1-(3,5-diméthylbenzoyl)-2-{1'-hydroxy-1'-(4-chloro-3-trifluorométhylphényl)-méthyl)-4-pipéridone ou l'un de ses sels.

116. Procédé pour la préparation d'une composition pharmaceutique, caractérisé que l'on mélange un composé 1-acylpipéridine de formule



15 où R₁ représente dans la formule I un reste aralkyle, aryloxyalkyle, hétéroaralkyle, aroyle, hétéroaroyle, cycloalkylcarbonyle, alcanoyle, hétéroarylalcanoyle, aralcoy carbonyle ou arylcarbamoyle éventuellement substitué ou le reste acyle d'un α-amino-acide éventuellement N-substitué par un alcanoyle inférieur ou par un carbamoylalcanoyle inférieur, R₂ représente un cycloalkyle ou un reste aryle ou hétéroaryle éventuellement substitué ou représente dans la formule X un reste aroyle, hétéroaroyle, cycloalkylcarbonyle, alcanoyle, hétéroarylalcanoyle, aralcoy carbonyle ou arylcarbamoyle éventuellement substitué ou le reste acyle d'un α-amino-acide éventuellement N-substitué par un alcanoyle inférieur ou par un carbamoylalcanoyle inférieur, R₃ représente l'hydrogène, un alkyle, un carbamoyle ou un reste alcanoyle ou alcénoyle éventuellement substitué par le carboxy ou par un carboxy estérifié ou amidé, R₄ représente un reste aryle éventuellement substitué ou un reste hétéroaryle éventuellement partiellement hydrogéné, X₁ représente dans la formule I le méthylène, l'éthylène, une liaison directe, un groupe carbonyle éventuellement cétalisé ou un groupe hydroxyméthylène éventuellement éthérifié ou représente encore dans la formule X l'hydroxyméthylène, X₂ représente un alkylène, le carbonyle ou une liaison directe, X₃ représente le carbonyle, un oxoalkylène inférieur, un oxo-(aza)-alkylène inférieur ou un reste alkylène éventuellement substitué par un phényle, l'hydroxyméthyle, un carboxy éventuellement estérifié ou amidé, ou par un hydroxy au-delà de la position α et Y₆ et Y₇ représentent ensemble un oxo ou l'un de ses sels pharmaceutiquement utilisables avec des adjuvants pharmaceutiques usuels.